

Infective Diarrhea

การวินิจฉัย ผู้ป่วยต้องมีข้อใด ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ถ่ายเหลว > 3 ครั้งต่อวัน
2. ถ่ายเหลวเป็นมูก เลือด ตั้งแต่ 1 ครั้ง ต่อวัน
3. ถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน

การซักประวัติ

1. ลักษณะและปริมาณของอุจจาระ
2. อาการร่วม เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
3. โรคประจำตัว ประวัติการเดินทาง ประวัติอาหารที่รับประทาน
4. อาการขาดน้ำ เช่น หน้ามืด เป็นลม

การตรวจร่างกาย 1.Sign หน้าท้อง

2.ภาวะขาดน้ำ

ความรุนแรง	Mild 3-5%-	Moderate 6-9%	Severe >10%
Pules	ปกติ	เร็ว	เร็ว เบา
BP	ปกติ	ปกติ หรือ ต่ำ	ต่ำ
Activity	ปกติ	กระสับกระส่าย	กระวนกระวาย ซึมมาก
กระหายน้ำ	เล็กน้อย	ปานกลาง	มาก
เยื่อบุปาก	ปกติ	แห้ง	แห้งจนเหียว
น้ำตาล	มีน้ำตาล	ลดลง	ไม่มีน้ำตาล
กระหม่อมหน้า	ปกติ	บวมเล็กน้อย	บวมมาก
Skin Tugor	ดี	เสียเล็กน้อย	จับแล้วตั้งนานเกิน 4 วินาที
Capillary Refill	<2 วินาที	2-3 วินาที	3 – 4 วินาที

