Care Map Sepsis

โรงพยาบาลป่าพะยอม

Criteria	Order One day	Order Continue
Date...../...../..... **Diagnosis**..... **Early detection : SIRS** (2 ใน 4 ข้อ) ☐ BT > 38 C or < 36 C ☐ HR > 90 /min ☐ RR > 20 /min หรือ PaCO2 < 32 mm Hg ☐ WBC > 12,000 หรือ < 4000 หรือ มี band form neutrophil >10 % **First diagnosis** ☐ Sepsis ☐ Severe sepsis ☐ Septic shock (SBP < 90 หรือ MAP < 70 mmHg ในคนที่ไม่มี HT หรือต่ำกว่า baseline > 40 mmHgในคนที่มีHTอยู่เดิม) > **ตำแหน่งที่สงสัย Infection** ☐ Respiratory ☐ GI ☐ GU ☐ Soft tissue ☐ CNS ☐ CVS ☐ Systemic infection ☐..... ☐ ให้ยา ATB ภายใน 1 ชม. at ER ☐ Community acquired - Ceftriaxone 2 g ☐ สงสัย Melioidosis – Ceftazidime 2 g ☐ Healthcare associated infection - Tienam ☐ Get rid source of infection - Immunocompromise host ☐ DM type 2 ☐ CKD ☐ Liver cirrhosis ☐ Heart disease ☐ Thalassemia ☐ Other..... ☐ Immuno competent host **Progress note** .... ลงชื่อ.....	Date...../...../..... Admit ☐ อช ☐ อญ ☐ CBC c plt ☐ BUN, Cr, Electrolyte..... ☐ LFT ☐ UA ☐ H/C 2 sp. จากแขนข้างละ 1 specimen ☐ Sputum G/S C/S ☐ Urine G/S C/S ☐ Sputum AFB × 3 day ☐ Body fluid..... ☐ CXR, EKG ☐ Retain Foley's catheter (เท residual urine ทิ้ง) ☐ Retain NG tube ☐ Central line or cut down ☐ On oxygen canular /mask with bag.....LPM keep oxygen sat ≥95% ☐ NSS 1000 cc IV load 200 cc in 15 min x.....ครั้ง thendrip.....cc/hr. ☐ 5%D/NSS/ 5%D/N/2 1000 cc IV drip.....cc/hr. ☐ Hydrocortisone 100 mg IV stat then 200 mg IV drip in 24 hr ☐ DTX premeal and hs Keep 80-200 mg% DTX 200-250 ให้ RI 4 u DTX 251-300 ให้ RI 6 u DTX 301-350 ให้ RI 8 u DTX >350 ให้ RI 10 u + notify <70 ให้ 50% glucose 50 ml iv push+notify ☐ If HCT < 30% GM PRC.....U ได้แล้วให้เลย 1 U iv drip in 3 hr. (if serum K normal) ☐..... ลงชื่อ.....	☐ NPO เว้นยา ☐ Regular / Soft diet Regular/soft diabetic diet ☐ Low salt diet ☐ Record V/S I/O Keep urine out put>.....ml/.....hrs. ☐ Restric fluid < .....ml/day **Medication** ☐ Ceftriazone 2 gm IV OD c stat ☐ Ceftazidime ☐ 2 gm IV q 8 hr c stat (CCr > 50 mL/min) ☐ 2 gm IV q 12 hr c stat (CCr 10-50 mL/min) ☐ 2 gm IV q 24 hr c stat (CCr <10 Ml/min) ☐ Doxycycline (100) 1×2 pc c stat ☐ Paracetamol (500) 1 tab oral prn q 4-6 hr ☐ .... ลงชื่อ.....

ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี	แพทย์เจ้าของไข้.....
HN.....AN.....	Ward .....เตียง.....