

ชื่อยาทั่วไป	Acetylcysteine
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Acetylcysteine 100mg/pack-powder
กลุ่มยา	mucolytic agent
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	-ละลายเสมหะในโรกระบบทางเดินหายใจทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง -ใช้เป็น Antidote ของภาวะ acetaminophen poisoning -การรับประทานยาในรูปแกรนูล ให้นำมาละลายในน้ำหรือเครื่องดื่มอื่น ประมาณ 1 แก้ว
เภสัชวิทยา	ทำลาย พันธะdisulfideในโปรตีนของเสมหะ ทำให้เสมหะเหลวขึ้นและขับออก ง่าย
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<u>ข้อควรระวัง</u> ผู้ป่วยโรคหอบหืด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	-อาจมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน การรับรสเปลี่ยนไป ง่วงนอนหรือมีไข้ ซึ่งอาการ เหล่านี้จะหายเองเมื่อรับประทานยาเป็นระยะเวลาหนึ่ง -อาการแน่นหน้าอก หรืออาการหลอดลมหดตัวอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางราย
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1.75 บาท