

ชื่อยาทั่วไป	Albendazole
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	tablet 200 mg
กลุ่มยา	ANTHELMINTICS
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>ใช้ถ่ายพยาธิชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พยาธิตัวกลม เช่น พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย พยาธิไส้เดือน พยาธิเข็มหมุด พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ว่าจะเกิดจากพยาธิชนิดเดียวหรือหลายชนิด (Mixed infection)</p> <p><u>ขนาดและวิธีการใช้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป รับประทานขนาดเดียวกัน ดังนี้ * ในการรักษาโรคพยาธิตัวกลม ได้แก่ พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย พยาธิไส้เดือน พยาธิเข็มหมุด ให้รับประทานยาในขนาด 400 มิลลิกรัม (2 เม็ด) เพียงครั้งเดียว * ในการรักษาพยาธิตัวตืด และพยาธิสตรองจิลอยดีส์ ให้รับประทานยาขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน * ในการรักษาพยาธิใบไม้ในตับ ให้รับประทานยาขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ติดต่อกัน 3 วัน - ยาเม็ดอาจอยู่ในรูปเคี้ยว หรือกลืนทั้งเม็ด หรือบดแล้วนำมาผสมกับอาหาร - ถ้าไม่หายขาดภายใน 3 สัปดาห์ ให้ทำการรักษาซ้ำ
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	Albendazole ดูดซึมจาก ทางเดินอาหารได้ดี และใช้ได้ดีกว่า Mebendazole ในการกำจัดพยาธินอกทางเดินอาหาร
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> -ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี -ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ หรือในหญิงมีครรภ์ -ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคแผลในลำไส้ใหญ่ -ต้องรักษาสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้พยาธิกลับสู่ร่างกายใหม่
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาจพบอาการปวดศีรษะ ท้องเดิน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ มีไข้ ผื่นแดง ผื่นแพ้ยา
ค่าใช้จ่ายด้านยา	-