

ชื่อยาทั่วไป	Amitriptyline
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Tripta , Amitriptyline , Triptyline / GPO
รูปแบบ / ความแรง	Tablet ขนาด 10 mg , 25 mg
กลุ่มยา	Antidepressant (Tricyclic)
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p>ในระยะแรกให้ทานในขนาดต่ำ และค่อย ๆ เพิ่มยาทีละน้อย ทานยาวันละ 75 mg divided dose อาจเพิ่มขนาดยาให้สูงขึ้นได้ถึงวันละ 150 mg ให้ทานยาช่วงบ่าย หรือก่อนนอน เนื่องจากจะเกิด sedative effect ก่อนเกิดฤทธิ์ antidepressant effect การรักษาจะได้ผลสูงสุดประมาณ 30 วันหลังทานยา หรืออาจให้เริ่มรับประทานยาด้วยขนาด 50 -100 mg ก่อนนอน และเพิ่มครั้งละ 25 - 50 mg แต่ไม่เกิน 150 mg/วัน</p> <p>Adolescent and elderly patient ทานยาครั้งละ 10 mg วันละ 3 ครั้ง และ 20 mg ก่อนนอน</p> <p>Maintenance dose ทานยาวันละ 40 -100 mg อาจให้ทานยาครั้งเดียวก่อนนอน เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ให้ลดขนาดยาลงจนถึงระดับยาในขนาดต่ำสุดที่ได้ผลในการรักษา และให้ยาต่ออีกเป็นเวลา 3 เดือน หรือให้ทานยาในขนาดต่ำเป็นเวลานานกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับอาการของผู้ป่วยที่กลับมาเป็นใหม่</p>
เภสัชวิทยา	<p>มีฤทธิ์เป็น anticholinergic และ sedative</p> <p>ป้องกันการ re-uptake ของ Noradrenaline และ serotonin ที่ nerve terminal</p>
เภสัชจลนศาสตร์	<p>ยาคูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร</p> <p>ยากระจายตัวได้ดี จับกับ plasma protein ได้ดี</p> <p>Half-life 9 - 25 ชม Peak plasma levels 6 ชม. หลังจากทานยา ระดับยาในพลาสมามีช่วงกว้าง และไม่สัมพันธ์กับการตอบสนองของยา</p>
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาจมีผลข้างเคียง เช่น ง่วงนอน ปากแห้ง ตาพร่ามัว ปัสสาวะลำบาก ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ความดันต่ำ หรือความดันสูง ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ามเนื้อเกร็ง (คอแข็ง ขากรรไกรแข็ง ลิ้นแข็ง) เป็นต้น 2. อาจทำให้เกิดอาการแพ้ มีลมพิษ ผื่นคันได้ 3. ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ที่มีประวัติอาการชัก โรคตับ ต่อมลูกหมากโต ต้อหิน โรคหัวใจ คอพอกเป็นพิษ ผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 4. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยานอนหลับ, ยากล่อมประสาท, ยาแก้แพ้ หรือแอลกอฮอล์ เพราะอาจเสริมฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนมากขึ้น 5. ถ้าใช้ร่วมกับยากลุ่มกระตุ้นประสาทซิมพาเทติก (เช่น อะตรินาลิน ตูโดเอพีครีน) อาจทำให้ความดันสูง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	<p>ปากแห้ง ท้องผูก ตาพร่ามัว เกิดการตั้งของน้ำปัสสาวะ ต้อหินชนิดมุมปิด และอาจทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยสูงอายุ และมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้ผู้ป่วยเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เพิ่มเอนไซม์จากตับอ่อน ภาวะอาหารอึกเสบ และยาอาจมีผลทำให้เกิดอาการง่วงนอน</p>

ค่าใช้จ่ายด้านยา	-Tablet ขนาด 10 mg 0.5 บาท/เม็ด -Tablet ขนาด 25 mg 1 บาท/เม็ด
------------------	--