

ชื่อยาทั่วไป	Benztropine Mesylate
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Cogentin , Phatropine
รูปแบบ / ความแรง	injection ขนาด 1 mg/ml (2ml)
กลุ่มยา	Antidotes
Pregnancy Category	ไม่มีข้อมูล
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>-ใช้รักษาอาการ Parkinson โดยให้ร่วมกับ Antiparkinson ตัวอื่น</p> <p>-บรรเทาอาการผิดปกติของ extrapyramidal disorder (ยกเว้น tardive dyskinesia) ที่เกิดจากการใช้ยา neuroleptic drugs เช่น กลุ่ม phenothiazine</p> <p><u>ขนาดยา</u></p> <p>-ในผู้ป่วยโรคจิตที่มี acute dystonia หรือไม่สามารถให้ยาโดยการรับประทานได้ หรือต้องการให้ออกฤทธิ์เร็วควรให้โดยการฉีดยา</p> <p>-ไม่นิยมให้ยาโดยการฉีด IV เนื่องจากไม่มีความแตกต่างในการออกฤทธิ์ เมื่อฉีดยาทาง IM</p> <p>เริ่มให้ยาในขนาดต่ำก่อนแล้วจึงเพิ่มการให้ยาครั้งละ 0.5 mg ขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกินวันละ 6 mg</p> <p>-acute dystonic reactions ให้ฉีดยา IM หรือ IV ครั้งละ 1-2 ml จากนั้นอาจเพิ่มการให้รับประทานยา ครั้งละ 1-2 mg วันละ 2 ครั้ง</p> <p>extrapyramidal disorders จาก neuroleptic drugs ให้รับประทานยาครั้งละ 1-2 mg วันละ 2-3 ครั้ง อาการจะดีขึ้นภายใน 1-2 วัน หลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ สามารถหยุดยาได้</p>
เภสัชวิทยา	<p>-เป็น competitive antagonist ของ acetylcholine ที่ cholinergic receptor</p> <p>-ในผู้ป่วยโรค Parkinson ยาจะลด cholinergic activity ที่มากเกินไปบริเวณ basal ganglia</p> <p>-มีฤทธิ์ antihistamine</p>
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<p>-ห้ามให้ยาในผู้ป่วยที่มีต่อมลูกหมากโต ถ้าใส่ไม้บิบบตัว และผู้ป่วยที่เป็น angle-closure glaucoma</p> <p>-ควรให้ยาโดยระมัดระวังเมื่อผู้ป่วยได้ยาคิดต่อกันเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ต่อม thyroid เป็นพิษ หรือผู้ป่วยสูงอายุ</p> <p>-ยังไม่มีรายงานความปลอดภัยในการให้ยานี้กับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร</p> <p>-ยานี้ทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ</p>

	<p>เครื่องจักร</p> <p>-ห้ามให้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี</p>
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	<p>-รูม่านตาขยาย สายตาพร่ามัว ความดันภายในลูกตาเพิ่ม</p> <p>-คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ท้องผูก</p> <p>-เกิดอาการทางประสาท ชาตามปลายแขน ขา เมื่อยขา เกิดภาพหลอน ง่วงซึม ตื่นเต้น</p> <p>-ผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดสูงหรือไวต่อยา จะเกิดอาการตื่นเต้น สับสน อ่อนเพลีย และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก ควรหยุดยา และถ้าต้องให้ยาชนิดอื่นต้องให้ยาในขนาดต่ำกว่าก่อน</p>
ค่าใช้จ่ายด้านยา	133 บาท