

ชื่อยาทั่วไป	Benzyl benzoate
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	โลชั่น 25 % 60 มิลลิลิตร , 450 มิลลิลิตร
กลุ่มยา	ยาใช้ภายนอก External drugs / อิมัลชัน
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ทารักษาหิดเหา <u>วิธีใช้</u> รักษาหิด ซโลมให้ทั่วหลังอาบน้ำตั้งแต่คอซอกข้อพับต่างๆ ซอกนิ้วมือนิ้วเท้า รักแร้ ขาหนีบ อวัยวะเพศ ให้ทาหลังอาบน้ำเข้า เย็น ติดต่อกัน 3 วัน ในเด็กเล็กให้เจือจางน้ำเท่าตัวก่อนทาและทำซ้ำอีก 1 สัปดาห์ถัดไป
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ควรระวังอย่าให้ยาเข้าตา อาจระคายเคืองได้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	เนื่องจากยาเป็นรูปแบบอิมัลชันจึงให้เขย่าขวดก่อนใช้ยา ในผู้ใหญ่ให้ใช้ยาในขนาดความเข้มข้น 25% ส่วนในเด็กเล็กให้เจือจางความเข้มข้นของยาลงเหลือครึ่งหนึ่ง โดยแบ่งยามาเติมน้ำเท่าตัว แล้วผสมให้เข้ากัน เนื่องจากยานี้ทำให้เกิดอาการแสบร้อนได้บ่อย
ค่าใช้จ่ายด้านยา	โลชั่น 60 มิลลิลิตร 30 บาท/ขวด
คำแนะนำที่ควรให้ผู้ป่วย (คำเตือน ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง)	1.ไม่ควรใช้ยานี้บนผิวหนังที่มีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันหรือเป็นแผลที่มีหนอง เย็บแผลหรือแผลสด และต้องระวังไม่ให้ยานี้ถูกตา ใบหน้า หรือเยื่อเมือก 2.ใช้ยานี้แล้วเกิดอาการระคายเคืองหรือเกิดอาการแพ้ให้หยุดยาทันทีและล้างออกด้วยน้ำสบู่และน้ำ ยานี้ไม่สามารถป้องกันโรคหิดหรือเหา แต่หลังจากรักษาแล้ว ควรป้องกันการเป็นหิดหรือเหาใหม่ โดยซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอดหมอน ด้วยน้ำร้อน และอบด้วยความร้อน อย่างน้อย 20 นาที