

| | |
|--|--|
| ชื่อยาทั่วไป | Bisacodyl |
| ชื่อการค้า / ผู้ผลิต | ที.แมน ฟาร์มา |
| รูปแบบ / ความแรง | ยาเม็ด 5 mg/tab ทำเป็นยาเม็ดเคลือบเพื่อให้ออกฤทธิ์ในส่วนของลำไส้ |
| กลุ่มยา | stimulant laxative |
| Pregnancy Category | C |
| ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | <u>ข้อบ่งใช้</u> เป็นยาระบาย ออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ <u>ขนาดและวิธีใช้</u> เด็ก : อายุเกิน 6 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ดก่อนนอน ผู้ใหญ่ : รับประทานครั้งละ 2 -3 เม็ด ก่อนนอน ยาจะออกฤทธิ์หลังกินยา ประมาณ 12 ชั่วโมง |
| เภสัชวิทยา | bisacodyl ซึ่งเป็น diacetic ester จะถูก hydrolyzed ที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ได้สารซึ่งมีหมู่ diphenolic ที่เป็นอิสระ สารดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมของน้ำและมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ bisacodyl |
| เภสัชจลนศาสตร์ | - |
| ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ | 1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้ อาเจียน ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ลำไส้มีการอุดตัน 2. ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ (Category C) หรือ ระยะเวลาให้นมบุตร 3. ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินกว่า 1 สัปดาห์ 4. ห้ามเคี้ยวยา หรือบดเพราะจะทำให้เปลือกที่เคลือบยาไว้แตกตัว ซึ่งอาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ 5. ระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี 6. ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดกรดหรือนม |
| อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา | อาการบีบตัวของลำไส้มากเกินไป อ่อนเพลีย วิงเวียน ปวดเกร็งที่ช่องท้องอย่างรุนแรง ปวดบีบในท้อง หรือคลื่นไส้ อาเจียน |
| ค่าใช้จ่ายด้านยา | 1 บาท/เม็ด |