

ชื่อยาทั่วไป	Bromhexine
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาเม็ด 8 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	กลุ่ม Mucolytic
Pregnancy Category	A
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ลดความเหนียวเหนืดของเสมหะ <u>ขนาดที่ใช้</u> เด็กอายุ 6-12 ปี กิน ½-1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร เด็กอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป กิน 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร
เภสัชวิทยา	กลไกการออกฤทธิ์ของยาบรอมเฮกซีน คือ เพิ่มสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ และทำให้ขนกวัดหรือขนของเซลล์ (Cilia) ซึ่งอยู่ที่ผนังท่อทางเดินหายใจของมนุษย์โบกพัด นำเอาสิ่งสกปรก รวมถึงเสมหะออกจากท่อทางเดินหายใจ
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อควรระวังในการใช้ยาบรอมเฮกซีน คือ - ระวังการใช้ยาในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคกระเพาะอาหาร-ลำไส้ ด้วยยามีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหาร-ลำไส้ - ระวังการใช้ยาในผู้ที่มีประวัติเป็น โรคหืด ด้วยยาอาจก่อให้เกิดภาวะหลอดลมตีบ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร-ลำไส้ ปวดศีรษะ ง่วงนอน เหงื่อออกมาก ผื่นคัน มีอาการไอเพิ่มขึ้น หลอดลมตีบ
ค่าใช้จ่ายด้านยา	0.5 บาท/เม็ด