

ชื่อยาทั่วไป	CASTOR OIL
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	น้ำมันละหุ่ง oil 450 ml
กลุ่มยา	stimulant laxative
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ท้องผูก <u>ขนาดยา</u> การให้ยาทางปาก ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 15-60 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง ตามต้องการ ผู้ ที่ตอบสนองดีอาจใช้เพียง 4 มิลลิลิตร ควรกินยาตอนท้องว่าง อาจแช่เย็นหรือ ผสมกับน้ำผลไม้เพื่อให้กินง่ายขึ้น
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์กระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้โดยตรง
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<u>ข้อควรระวัง</u> หากใช้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่ และเกิดการติดยาถ่าย (cathartic colon) <u>ข้อห้ามใช้</u> ผู้มีประวัติเพ้อฝัน หลงตั้งครรภ์ (น้ำมันละหุ่งมีฤทธิ์กระตุ้นอย่างแรงและสามารถ ทำให้มดลูกหดตัวซึ่งอาจทำให้คลอดก่อนกำหนดได้) ผู้ที่มีอาการของไส้ติ่ง อักเสบ ผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดช่องท้อง การมีก้อนอุจจาระอัดแน่นในลำไส้ใหญ่ การอุดตันของทางเดินอาหาร ผู้มีอาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ปวดท้องอย่างกะทันหัน ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ระบายเลือดรอบทวารหนัก ปวดเกร็งในช่องท้อง อ่อนแรง เวียนศีรษะ หมดสติชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายด้านยา	-