

ชื่อยาทั่วไป	CLOTRIMAZOLE Vaginal Tablets
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Vaginal Tablets 100 mg ใน Vaginal tablet 1 เม็ด ประกอบด้วย Clotrimazole 100 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	Antifungal
Pregnancy Category	B FDA พบ birth defect ได้ในกรณีที่ใช้ VT ใน first trimester (3 เดือนแรก) ค่ะ แต่พบว่ามีความปลอดภัยถ้าใช้ใน ช่วง second (เดือนที่4-6) และ third trimester (เดือนที่7-9)
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ใช้รักษาอาการอักเสบของช่องคลอดจากเชื้อรา ผู้ป่วยมักมีอาการคัน แสบช่องคลอด ตกขาวจะมีไม่มากนัก แต่จะมีลักษณะเป็นก้อน คล้ายตะกอนนม <u>ขนาดและวิธีการใช้</u> ใช้เหน็บช่องคลอด ครั้งละ 1 เม็ด เช้าและก่อนนอน 6 วัน หรือเหน็บก่อนนอนครั้งละ 2 เม็ด 3 วัน <u>วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด</u> ปัสสาวะก่อนให้เรียบร้อย ล้างมือให้สะอาด แคะกระดาก ห้อยยาออก จุ่มยาลงในน้ำสะอาดพอให้เปียกหมาดๆ นอนหงายชันเข่า แล้วค่อยๆ สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุด นอนพักสักครู่ เพื่อให้ยาละลายหมด
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	1.หยุดเมื่อมีอาการระคายเคืองหรือแพ้ 2.เคยมีอาการผื่นปฏิกิริยาใดๆ หรือมีประวัติการแพ้ยาโคลทริมาโซล (clotrimazole) หรือยาต้านเชื้อรากลุ่มเอโซล (azole antifungals) ตัวอื่น หรือ ส่วนประกอบใด ๆ ในยานี้ 3.ในขณะที่ใช้นี้อาจมีของเหลวไหลออกจากช่องคลอด เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเปราะเปรี๊นเสื้อผ้าของท่านควรรองด้วยกระดาษทิชชูหรือสวมผ้าอนามัย ไม่ควรใช้ผ้าอนามัยแบบสอดระหว่างการรักษาเนื่องจากอาจดูดซับด้วยยา
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	1.ผิวหนังร้อนแดง ปวดแสบปวดร้อน เกิดเป็นเม็ดตุ่มพอง บวม คัน ลมพิษและระคายเคือง 2.ระคายเคืองบริเวณช่องคลอด คัน หรือแสบ ปวดขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะลำบาก
ค่าใช้จ่ายด้านยา	2.50 บาท