

ชื่อยาทั่วไป	COLCHICINE
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Tablets 0.6 mg
กลุ่มยา	AGENTS FOR GOUTH
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> Treatment of acute gouty arthritis attacks and prevention of recurrences of such attacks <u>ขนาดยา</u> Prophylaxis of acute attacks: Oral: 0.6 mg twice daily. Acute attacks: Oral: Initial: 0.6-1.2 mg, followed by 0.6 every 1-2 hours
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง PMN และการปล่อย chemotactic factor จาก PMN จึงลดอาการอักเสบ ใช้เวลานานได้ไม่มีผลระคายเคืองกระเพาะจนถึงขั้นรุนแรงและไม่มีผลต่อการทำงานของไต
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ที่มีโรคของระบบทางเดินอาหาร. ไต และหัวใจผิดปกติ และห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคของตับและไตร่วมกัน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง (นอกจากนี้ยังทำให้ผมร่วง กดไขกระดูก ประชาทส่วนปลายอักเสบ กล้ามเนื้อผิดปกติ แต่โอกาสที่จะเกิดอาการเหล่านี้ น้อย
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1 บาท