

ชื่อยาทั่วไป	Chloramphenicol Eye Ointment
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ใน 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยา Chloramphenicol 1 กรัม Eye ointment
กลุ่มยา	Ophthalmic Ointment
Pregnancy Category	ไม่มีข้อมูล
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผลที่มีการติดเชื้อรุนแรงกรณีที่ใช้ยาที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเขื่อน้อยกว่าไม่หาย - ผิวหนังอักเสบ แผลติดเชื้อหรือแผลไฟไหม้ รุขุมขนอักเสบ ฝี หนอง - รักษาการติดเชื้อที่ตา รวมทั้งการติดเชื้อที่เยื่อตาขาว และ/หรือ แก้วตา (เฉพาะรูปแบบสำหรับตา: Chloramphenicol eye ointment) - Chloramphenicol มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดดังนี้ <p>Staphylococcus aureus</p> <p>Streptococcus, including Streptococcus pneumoniae</p> <p>Escherichia coli</p> <p>Haemophilus influenzae</p> <p>Klebsiella/Enterobacter species</p> <p>Moraxella lucunata (Morax-Axenfeld bacillus)</p> <p>Neisseria species</p> <p>ขนาดและวิธีการใช้</p> <p>ป้ายตา วันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน หรือตามแพทย์สั่ง</p>
เภสัชวิทยา	Chloramphenicol is a broad-spectrum antibiotic originally isolated from Streptomyces venezuelae. It is primarily bacteriostatic and acts by inhibition of protein synthesis by interfering with the transfer of activated amino acids from soluble RNA to ribosomes.
เภสัชจลนศาสตร์	-

ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน 2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา หรือส่วนประกอบของยานี้ 3. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายถึงตายได้ ให้ใช้ตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด 4. เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา)
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	
คำแนะนำการใช้ยาซึ่งป้ายตา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 2. นอนหรือเอนศีรษะไปด้านหลัง ดึงเปลือกตาด้านล่างลง 3. บีบยาเล็กน้อย ประมาณ 1 ส่วน 4 ป้ายลงในเปลือกตาด้านล่าง ระวังอย่าให้ปลายหลอดแตะกับตา 4. ปิดตาเบาๆ และกลอกตาไป-มาทุกทาง 5. หากต้องใช้ยาหยอดตาพร้อมกับยาป้ายตา ควรใช้ยาหยอดตาก่อน ประมาณ 5 นาที จึงใช้ยาป้ายตา
ค่าใช้จ่ายด้านยา	17 บาท/หลอด