

ชื่อยาทั่วไป	Chlorhexidine Solution
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Solution, 0.5% 500 ml
กลุ่มยา	Antiseptics
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ใช้เป็น antiseptic ใช้ scrub ผิวหนัง, มือก่อนการผ่าตัด <u>วิธีใช้/ขนาดยา</u> ฟอกมือก่อนทำหัตถการ ฟอกแผล
เภสัชวิทยา	ฤทธิ์ low level แต่ฆ่าเชื้อพวกกรัมบวก เช่น Streptococcus spp. และ Staphylococcus spp. ดีมาก ออกฤทธิ์เร็วและมีฤทธิ์อยู่นาน ฤทธิ์ถูกยับยั้งโดยสิ่งสกปรกและน้ำกระด้าง กรณีที่เจือจางแล้วไม่ควรเก็บเกิน 7 วัน
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	- พิษและผลข้างเคียงของ Chlorhexidine มีน้อยมาก พิษและผลข้างเคียงของ Chlorhexidine ที่รุนแรงคือ Anaphylaxis พิษต่อ cornea หูชั้นกลาง และเชื้อหุ้มสมองเมื่อมีการสัมผัสกับ Chlorhexidine โดยตรง จึงไม่ควรใช้ Chlorhexidine ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับตา หู สมอง และไขสันหลัง - ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ ผื่นผิวหนังและการระคายเคืองเยื่อช่องปาก
ค่าใช้จ่ายด้านยา	-