

ชื่อยาทั่วไป	Clopidogrel hydrogen sulfate
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Plavix® / Berlin
รูปแบบ / ความแรง	Film-coated tablet : 75 mg
กลุ่มยา	Antiplatelet Agent; Platelet Aggregation Inhibitor
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันในผู้ป่วย suffering from MI, ischemic stroke, established peripheral arterial disease, non – ST segment elevation acute coronary syndrome in combination w/ ASA  -Recent MI, recent stroke, or established arterial disease: 75 mg once daily -Acute coronary syndrome: Initial : 300 mg loading, followed by 75 mg once daily (in combination with aspirin 75-325 mg once daily) -Prevention of coronary artery bypass graft closure(saphenous vein): aspirin – allergic patients(unlabeled use): Loading dose: 300 mg following procedure ; maintenance : 50-100 mg/day
เภสัชวิทยา	Blocks the ADP receptors, which prevent fibrinogen binding at that site and thereby reduce the possibility of platelet adhesion and aggregation
เภสัชจลนศาสตร์	Absorption well absorbed Metabolism hepatic via hydrolysis Excretion urine 50% feces 46% Elimination Half life 8 hour
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ ี - active pathological bleeding such as PUD or intracranial hemorrhage - coagulation disorders - severe liver impairment - Lactation ข้อควรระวัง - ควรระมัดระวังในผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกเพิ่มมากขึ้นจากบาดแผล - การผ่าตัดหรือพยาธิสภาพอื่นๆ ถ้าผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดควรหยุดยา Plavix® ก่อนเข้ารับการผ่าตัด - ผู้ที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร Plavix® อาจจะทำให้ bleeding time นานขึ้น - ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับรุนแรงซึ่งอาจเกิด bleeding diatheses
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	abdominal pain, dyspepsia, diarrhea, nausea, chest pain, hypertension,

	headache, dizziness, rash , pruritus, GI bleeding, intracranial bleeding, purpura, bruising
ค่าใช้จ่ายด้านยา	25 บาท/เม็ด