

ชื่อยาทั่วไป	Co-trimoxazole (Sulfamethoxazole+trimethoprim) syr.
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Bactrim
รูปแบบ / ความแรง	ยาน้ำ SMX 200 มิลลิกรัม +TMP 40 มิลลิกรัม/ 1 ซ้อนชา
กลุ่มยา	ยากุ่มซัลฟา Sulfonamide
Pregnancy Category	C (CATD กรณีใช้ในไตรมาสที่ 3)
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ข้อบ่งใช้ รักษาอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ท้องเสีย ขนาดที่ใช้ <u>ยาเกิน</u> 6-12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ทุก 12 ชั่วโมง เด็ก < 2 ขวบ ครั้งละ ครั้งซ้อนชา วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า-เย็น อายุ 2-6 ขวบ ครั้งละ ครั้ง-หนึ่ง ซ้อนชา วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า-เย็น อายุ 6-12 ขวบ ครั้งละ หนึ่ง-สอง ซ้อนชา วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า-เย็น ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า-เย็น
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อห้ามใช้ -ผู้ป่วยโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กและเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน ข้อควรระวัง -ผู้ป่วยที่เป็น โรคตับและไต
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตับและไตอักเสบ
ค่าใช้จ่ายด้านยา	12 บาท