

| | |
|--|---|
| ชื่อยาทั่วไป | DEXAMETHASONE |
| ชื่อการค้า / ผู้ผลิต | - |
| รูปแบบ / ความแรง | Inj. ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยยา Dexamethasone SO4 4 มิลลิกรัม |
| กลุ่มยา | ADRENALS |
| Pregnancy Category | C |
| ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | <p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>ใช้เป็นยาด้านอักเสบและแก้แพ้ เช่น รักษาอาการแพ้ชนิดรุนแรงหรือเรื้อรัง เช่น หืด แพ้ยา โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง หรือกลุ่มโรคออโตอิมมูน</p> <p><u>ขนาดและวิธีใช้</u></p> <p>- เด็ก 0.08-0.3 มก./กก./วัน เข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าหลอดเลือดดำแบ่งให้ทุก 6-12 ชั่วโมง</p> <p>- ผู้ใหญ่ฉีดวันละ 4-20 มก. เข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าหลอดเลือดดำแบ่งให้ทุก 6-12 ชั่วโมง</p> <p><u>ขนาดยา:</u></p> <p>Anti-inflammatory: I.M., I.V.: 0.75-9 mg/day in divided doses every 6-12 hours. Extubation or airway edema: I.M., I.V.: 0.5-2 mg/kg/day in divided doses every 6 hours.</p> <p>infusion regimen: Oral or I.V.: 10 mg every 12 hours on each treatment day.</p> |
| เภสัชวิทยา | - |
| เภสัชจลนศาสตร์ | - |
| ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ | <p>ห้ามใช้ในคนที่เป็นแผล โรคติดเชื้อรา โรคติดเชื้อไวรัสบางชนิด ต้อหินหรือคนที่แพ้ยาในกลุ่มนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรใช้เท่าที่จำเป็น อย่าพร่ำเพรื่อ อย่าใช้เป็นยาลดไข้แก้ปวด หรือแก้อักเสบ โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุ 2. ควรใช้ยาลดกรดกินควบด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะ 3. พืชในระยะสั้น อาจทำให้แผลกำเริบน้ำตาลในเลือดสูง (อาจเป็นเบาหวานได้) ลดภูมิคุ้มกันของ ร่างกายทำให้ติดเชื้อ (เช่น วัณโรค ปอดอักเสบ) ได้ง่าย 4. พืชในระยะยาว ทำให้บวมกระดูกหูหึ่งง่าย แผลหายช้า มีจ้ำเขียวขึ้นตามผิวหนังเกลือแร่ในร่างกายเสียความสมดุล เป็นต่อกระดูก ต้อหิน ความดันโลหิตสูง หน้าบวมมีหนวดขึ้น เป็นสิ่ว โรคจิตประสาท 5. ผู้ป่วยที่ใช้สเตียรอยด์ติดต่อกันนาน ๆ เมื่ออาการดีขึ้น ต้องค่อย ๆ ลดขนาดของยาลงทีละน้อย เพื่อให้ต่อมหมวกไตค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้น หากหยุดยาทันทีโดยที่ต่อมหมวกไตยังฟื้นตัวไม่ดีก็อาจเกิดอันตรายถึงตายได้ เนื่องจาก "ภาวะวิกฤตจากต่อมหมวกไตฝ่อ" 6. ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้ม ไตวาย ความดันโลหิตสูง |

| | |
|--------------------------------|--|
| | เบาหวานกระดูก ผู้ที่เคยมีประวัติวัณโรค |
| อาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา | อาจทำให้เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคแผลเพื่ปติกกำเริบ บวม กระดูก แผลหายช้าติดเชื้อง่าย |
| ค่าใช้จ่ายด้านยา | 6.25 บาท |