

ชื่อยาทั่วไป	Dextromethorphan
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาเม็ด 15 มิลลิกรัมต่อเม็ด
กลุ่มยา	Antitussive
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ระวังอาการไอ แก้ไอแห้ง ๆ ที่ไม่มีเสมหะ มีฤทธิ์กดอาการไอ <u>ขนาดที่ใช้</u> เด็กอายุ 6-12 ปี กิน ½-1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง เด็กอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป กิน 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อห้ามใช้ 1. ไม่ควรใช้ในกรณีไอมีเสมหะ หรือในเด็กเล็ก < 6 ปี 2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ ผู้ป่วยที่มีอาการไอเรื้อรัง เช่น ไอจากการสูบบุหรี่ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง หรือการไอที่มีเสมหะมาก 3. เมื่ออาการไอยังคงอยู่หลังจากใช้ยาแล้วนาน 7 วัน หรือมีไข้สูง มีผื่นขึ้น มีอาการปวดศีรษะร่วมกับการไอ ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	โดยทั่วไปไม่ค่อยพบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง แต่อาจพบอาการง่วง ซึม เวียนศีรษะ ตื่นเต้น สมองสับสน และระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1 บาท