

ชื่อยาทั่วไป	DIMENHYDRINATE
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาเม็ด 50 มิลลิกรัม ยาฉีด 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
กลุ่มยา	antihistamine
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ใช้รักษาอาการเมารถเมาเรือ อาการวิงเวียน <u>ขนาดที่ใช้</u> ยากิน อายุ 2-5 ปี ¼ เม็ด (12.5 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร อายุ 6-12 ปี ½-1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 300 มิลลิกรัม/วัน ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<u>ข้อควรระวัง</u> 1. ควรระวังในการใช้ควบคู่กับยาปฏิชีวนะที่มีผลทำลายหู ซึ่งได้แก่ Gentamicin , Kanamicin เนื่องจากยาจะไปบดบังอาการ อาจทำให้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้ 2. ยานี้ทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 3. ยังไม่มีรายงานความปลอดภัยจากการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ และควรระมัดระวังการใช้ยาในหญิงระยะให้นมบุตร เพราะยาอาจยับยั้งการหลั่งน้ำนม <u>ข้อห้ามใช้</u> 1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาลดอาการแพ้ และยาที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกัน 2. ห้ามใช้ร่วมกับยา MAO – inhibitor เช่น Isocarboxazid , Tranylcypromine , Phenelzine เป็นต้น 3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อหินมุมแก้ว โรคความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง โรคหอบ โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ 4. ห้ามใช้ร่วมกับสารที่มีแอลกอฮอล์ และสารที่กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการที่พบบ่อยคือ ง่วงซึม - อาการอื่นๆ ที่พบเช่น ปวดศีรษะ ตาพร่า อาการดั่งอยู่ในหู ปากคอแห้ง เบื่ออาหาร ท้องผูกหรือท้องร่วง

ค่าใช้จ่ายด้านยา	ยาเม็ด 50 มิลลิกรัม 0.5 บาท/เม็ด ยาน้ำ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 24 บาท/เม็ด
คำเตือน	-ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล -หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม