

ชื่อยาทั่วไป	Diphtheria tetanus vaccine (dT)
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	รูปแบบ, ความแรง 0.5 ml x 10 dose โดยวัคซีนดังกล่าวประกอบด้วย purified tetanus toxoid 5-10 Lf และ purified diphtheria toxoid 1-2 Lf ต่อ 0.5 มล.
กลุ่มยา	Immunological Products and Vaccines
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ให้ในเด็กอายุมากกว่า 7 ปี และผู้ใหญ่ ปัจจุบันแนะนำให้ใช้ dT แทน tetanus vaccine เสมอ ในทุกกรณีเพราะจะได้มีภูมิต้านทานคอตีบร่วมด้วย <u>วิธีใช้/ขนาดยา</u> ฉีดทุก 10 ปีในผู้ที่เคยได้ DT หรือ DTP มาก่อน ในกรณีที่ไม่เคยได้ DT หรือ DTP ให้ฉีดที่เดือน 0, 1, 6 โดยฉีด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ
เภสัชวิทยา	ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น ดูวัคซีน DTP
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ 1) ในกรณีที่มีบาดแผลที่อาจติดเชื้อบาดทะยัก พิจารณาฉีดซ้ำหากเข็มสุดท้ายนานเกินกว่า 5 ปี 2) ในหญิงตั้งครรภ์ให้ใช้ dT แทน Tetanus vaccine เพื่อให้ได้รับวัคซีน ไอกรน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ปฏิกิริยาจากวัคซีน ในคนที่ได้รับวัคซีนบาดทะยักบ่อยเกินไป อาจเกิดปฏิกิริยา Arthus reaction ได้ ส่วนปฏิกิริยาอื่นๆ อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกับ DTP Serious
ค่าใช้จ่ายด้านยา	30 บาท
คำแนะนำที่ควรให้ผู้ป่วย	สังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน หากมีอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีนให้กลับมาพบเจ้าหน้าที่
การเก็บและการหมดอายุ	ให้เก็บวัคซีนในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ถ้าแช่วัคซีนนี้ให้เย็นจนแข็งจะเสื่อมคุณภาพทันที การเก็บวัคซีนอย่างถูกต้อง วัคซีนจะมีอายุประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต