

ชื่อยาทั่วไป	Efavirenz
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Stocrin ®
รูปแบบ / ความแรง	ใน 1 แคปซูลประกอบด้วยตัวยา efavirenz ขนาด 600 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	antiviral
Pregnancy Category	D
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u> ใช้ร่วมกับยาต้านเชื้อ HIV อื่นๆ ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 ในเด็กและผู้ใหญ่</p> <p><u>ขนาดและวิธีใช้ยา</u></p> <p>การรับประทานยาสามารถให้ก่อนหรือพร้อมหรือหลังอาหารก็ได้ หลีกเลี่ยงการรับประทาน efavirenz ร่วมกับอาหารไขมันสูง เนื่องจากสามารถเพิ่มระดับ efavirenz ได้ร้อยละ 50</p> <p><u>ผู้ใหญ่</u></p> <p>ขนาดของยาเมื่อใช้ร่วมกับในยาในกลุ่มที่ยับยั้งเอนไซม์ Protease และ/หรือยากลุ่ม nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTs) คือรับประทานครั้งละ 600 มิลลิกรัม วันละครั้ง ก่อนหรือพร้อมหรือหลังอาหารก็ได้</p> <p>เพื่อลดผลข้างเคียงทางระบบประสาทและเพิ่มความทนทานต่อยา ควรกินยาก่อนนอนในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกของการใช้ยาและในผู้ป่วยที่ยังเกิดอาการข้างเคียงทางระบบประสาทอยู่</p>
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<p>- ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้ยา efavirenz หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในตำรับ</p> <p>- ไม่ควรใช้ยา efavirenz ร่วมกับยา Terfenadine, astemizole, cisapride, midazolam, triazolam หรือ ergot derivatives เนื่องจากยา Efavirenz ยับยั้ง CYP 3A4 แบบแข่งขัน ทำให้ยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของยาเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและ/หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ (ตัวอย่างเช่น หัวใจเต้นผิดปกติ หว้าง ง่วงซึมเป็นเวลานาน และกดการหายใจ)</p> <p>- ห้ามใช้ยา efavirenz ในรูปยาเคี้ยวในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือเพิ่มเข้าไปเพียงตัวเดียวในการรักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาต้าน HIV อื่นๆ ไม่ได้ผล</p> <p>- ถ้าจำเป็นต้องหยุดยาอันเนื่องมาจากสงสัยว่าทนต่อยาตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ ให้พิจารณาyarอบคอบเพื่อหยุดยาร่วมทั้งหมด เมื่อแก้ปัญหานั้นเนื่องจากอาการข้างเคียงของยาได้แล้ว ให้เริ่มต้นให้ยาต้านไวรัสทุกตัวพร้อมกันอีกครั้ง ไม่ควรให้ยาแบบยาเคี้ยวเป็นช่วงๆ หรือค่อยๆ เพิ่มชนิดของยาต้านไวรัส เพราะอาจเพิ่มการก่อให้เกิดไวรัสที่ื้อต่อยาได้</p>
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยาที่สำคัญคือ อาการทางระบบประสาทซึ่งพบได้ถึง 50 % ในผู้ใหญ่ ได้แก่ กระสับกระส่าย สับสน นอนไม่หลับหรือนอนมาก ผื่นร่าย

	<p>ประสาทหลอน (hallucination) ไม่มีสมาธิ อารมณ์สุข ความคิดผิดปกติ บุคลิกภาพเปลี่ยน แต่พบในเด็กเพียง 14 % ผลข้างเคียงอื่น ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย ระดับเอนไซม์ aminotransferase สูงขึ้น ออกผื่นและคัน ซึ่งปกติเป็นชนิด maculopapular เกิดใน 2 สัปดาห์แรก ผลข้างเคียงที่รุนแรงได้แก่ Stevens-Johnson syndrome แต่พบน้อย</p>
ค่าใช้จ่ายด้านยา	12 บาท