

ชื่อยาทั่วไป	Ethinylestradiol 0.05 mg และ Norgestrel 0.5 mg
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	JENY F.M.P.
รูปแบบ / ความแรง	Tablet 28 เม็ด/แผง
กลุ่มยา	Contraceptive
Pregnancy Category	Pregnancy Category X
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ยากุมฉุกเฉินฮอร์โมนผสม วิธีรับประทาน : รับประทานเม็ดสีขาว 2 เม็ดทันที และอีก 2 เม็ดในเวลา 12 ชั่วโมงต่อมา
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์โดยทำให้มีการสร้างมูกเหนียวที่ปากมดลูก (cervical mucus), กดการหลั่ง pituitary hormone, ยับยั้งการตกไข่, สลาย corpus luteum, ลดระยะ luteal phase, ยับยั้งฮอร์โมนที่จะมาจับกับ receptors และกระตุ้นการทำงานของเยื่อบุมดลูก, เปลี่ยนแปลงเวลาที่ไข่เคลื่อนผ่านท่อนำไข่, และเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของมดลูก ทำให้รบกวนการฝังตัวของไข่ที่อาจเกิดการผสมพันธุ์แล้ว แต่การใช้ฮอร์โมนในขนาดสูง จะไม่ช่วยเพิ่มอัตราการแท้งเอง (spontaneous abortion) และจะไม่ได้ผลหลังไข่ฝังตัวแล้ว
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ใน ผู้ที่แพ้ยา หรือ ส่วนประกอบใดๆ ของยา โดยเด็ดขาด ไม่ควรใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เพราะไม่ทำให้เกิดการแท้ง แต่จะทำให้ทารกพิการผิดปกติได้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ประจำเดือนผิดปกติ มาช้า หรือมาแบบกะปริดกะปรอย และอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่หากใช้บ่อยและต่อเนื่อง ก็มีโอกาสดังครรภ์นอกมดลูกได้
คำเตือน	ถ้าผู้ป่วยอาเจียนในช่วง 2 ชั่วโมงหลังจากการกินยาเม็ดแรก จะต้องกินเม็ดแรกซ้ำอีกครั้ง
ประสิทธิภาพในการป้องกันการ	กรณีที่ถูกข่มขืน หากกินยาอย่างถูกต้อง คือ กินยาครั้งแรกภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน และอีก 12 ชั่วโมงถัดมา กินยาครั้งที่สอง

ตั้งครรภ์	ยานี้จะมีประสิทธิภาพในการลดโอกาสตั้งครรภ์ได้ 75 เปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่ายด้านยา	บาท/เม็ด