

ชื่อยาทั่วไป	FBC
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาเม็ด โดยทั่วไปจะมี 60 มิลลิกรัม ประกอบด้วย ferrous fumarate 200 mg (เทียบเท่ากับ ธาตุเหล็ก 65 mg), Vitamin B1 2 mg, Vitamin B2 2 mg, Vitamin B12 5 mcg, Vitamin C 20 mg, niacin 10 mg, Folic acid 100 mcg และ Ca phosphate tribasic 100 mg2
กลุ่มยา	-
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> สำหรับป้องกันและรักษาผู้ป่วยภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก , ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ หรือเป็น Iron supplement ในหญิงตั้งครรภ์ <u>ขนาดที่ใช้</u> รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	1. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เป็น โรคโลหิตจางชนิด Megaloblastic ที่ขาดวิตามินบี 12 2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับยา Tetracycline เพราะจะทำให้การดูดซึมของยา Tetracycline ลดลง 3. ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาลดกรด เพราะจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลง 4. รับประทานยานี้แล้วอาจจะเป็นสีดำ หรืออาจเกิดอาการท้องผูก หรือท้องว่าง 5. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ซีดจากโรคธาลัสซีเมีย เพราะร่างกายของผู้ป่วยจะมีเหล็กสะสมมากเกินไปแล้วส่วนประกอบ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาจจะเป็นสีดำ นอกจากนี้อาจมี อาการแสบร้อนยอดอก ท้องเสีย มีคราบที่ฟัน หรือปัสสาวะเปลี่ยนสี
ค่าใช้จ่ายค่านยา	1 บาท