

ชื่อยาทั่วไป	Flunarizine
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	แคปซูล (capsule) 5 mg/capsule
กลุ่มยา	กลุ่มตัวต้านแคลเซียม (calcium antagonists)
Pregnancy Category	ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> บรรเทาอาการวิงเวียน (Dizziness), ภาวะวิงเวียนจนเห็นบ้านหมุน (Vertigo), ภาวะการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ (Cerebral or Peripheral Circulatory Disorder), ภาวะระบบการทรงตัวผิดปกติ (Vestibular disorder), ป้องกันการปวดหัว ไมเกรน <u>วิธีใช้/ขนาดยา</u> ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัม วันละ 2 – 3 ครั้ง หลังอาหาร หรือ 5 – 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์ป้องกันภาวะแคลเซียมสูงในเซลล์ โดยการลดการนำเข้าแคลเซียมเข้าเซลล์ ทำให้มีการผ่อนคลายของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านฮิสตามีน (antihistamine) อีก ด้วย
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	- ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ - สตรีตั้งครรภ์ ให้นมบุตร - ผู้ที่ต้องขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร เพราะยามีผลข้างเคียงทำให้ง่วงนอน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ผลข้างเคียงของยา คือ ง่วงซึม (Drowsiness) เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป และมี ผลข้างเคียงที่พบน้อย ได้แก่ เพิ่มความอยากอาหาร , น้ำหนักเพิ่ม, ปวดท้อง , คลื่นไส้ อาเจียน , ปากแห้ง, ปวดศีรษะ , ซึมเศร้า และ นอนไม่หลับ (insomnia) ซึ่งอาจ เกิดได้ในผู้ป่วยบางราย
ค่าใช้จ่ายค่านยา	1.5 บาท

คำแนะนำที่ควรให้ผู้ป่วย	<ol style="list-style-type: none">1. ในระหว่างที่ใช้ยาไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท ส่วนกลาง (CNS Depressants)2. ระวังการใช้ในผู้สูงอายุ ควรเริ่มในขนาดที่ต่ำเนื่องจากจะไวต่อยาสูงกว่าคนปกติ
-------------------------	--