

ชื่อยาทั่วไป	Fluoxetine
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	แอนแซก(Anzac) ฟลูออกซีน(Fluzac) ฟลูแซก(Prozac)
รูปแบบ / ความแรง	Capsule 20 mg
กลุ่มยา	กลุ่ม SSRIs – Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>มีฤทธิ์ในการรักษาโรคซึมเศร้าและอาการในกลุ่มโรควิตกกังวล</p> <p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>โรคซึมเศร้า ที่ขนาด 20-60 mg/day</p> <p>โรคย้ำคิดย้ำทำ ที่ขนาด 60-80 mg/day</p> <p>Premenstrual Dysphoric Disorder (อาการทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับการมีประจำเดือน) ที่ขนาด 20-60 mg/day</p> <p>GAD หรือ Anxiety Disorder อื่นๆ ที่ขนาด 20-60 mg/day</p> <p>ในกรณีผู้ป่วยสูงอายุ ควรเริ่มต้นให้ในขนาดครึ่งของที่แนะนำสำหรับแต่ละโรค</p> <p>ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรงดการให้ยา</p>
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์ยับยั้งการนำ serotonin ที่หลั่งออกมากลับเข้าไปในเซลล์ประสาทอีกครั้ง ทำให้มีปริมาณ Serotonin ในช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทมากขึ้น นานขึ้น ช่วยทำให้ระดับ Serotonin สูงขึ้น
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ควรระวังห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาแก้อาการซึมเศร้ากลุ่ม MAO inhibitors อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการซีโรโทนินรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ ก่อนจะใช้ยานี้ควรหยุดยา MAO inhibitors เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และก่อนใช้ยา ควรหยุดยาฟลูออกซีนเป็นเวลา 5 สัปดาห์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการข้างเคียงสำคัญของยานี้ ได้แก่ คลื่นไส้ (12-29 %) ง่วงซึม(5-17%) หรืออาจจะนอนไม่หลับ(10-33 %) ลดแรงกำหนัดทางเพศ(1-11 %) เบื่ออาหาร (4-11%) ท้องเสีย(8-18%) อ่อนเพลีย(7-21%) สั่น (3-13%) นกเขาไม่ขัน (<1-7%) เหงื่อไหลมาก(2-8%) หูอื้อ อาการเหมือน ไข้หวัด ความผิดปกติในการมองเห็น ผื่น คัน ปวดท้อง น้ำหนักลด(2 %) ผื่นผิดปกติ ผื่นแปลกๆ ปวดเค้นหน้าอก และอื่น ๆ เช่น <u>มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย</u> เป็นต้น <u>อาการที่พบน้อย แต่รุนแรง</u> เช่น อาการแพ้ ผื่นร่วง ปวดเค้นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ หอบ ต้อกระจก หัวใจล้มเหลว ดีซ่านจากการยับยั้งการไหลของน้ำดี ไตวาย ตับพัง Stevens Johnson Syndrome
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1.5 บาท

