

| | |
|--|---|
| ชื่อยาทั่วไป | Seretide MDI |
| ชื่อการค้า / ผู้ผลิต | Seretide MDI |
| รูปแบบ / ความแรง | Salmeterol xinafoate 25 mcg, fluticasone propionate 250 mcg |
| กลุ่มยา | Fluticasone Propionate (ซึ่งเป็น inhaled corticosteroids : ICS) และ Salmeterol (Long-acting β_2 - agonist : LABA) |
| Pregnancy Category | Pregnancy: C |
| ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | มีข้อบ่งใช้ในการผู้ป่วย moderate to severe persistent asthma หรือใช้ในผู้ป่วย COPD (รวมถึง chronic bronchitis และ emphysema เพื่อช่วย improve lung function , improve exacerbation rate asthma ,Chronic <u>Obstructive Pulmonary Disease</u> (COPD) ขนาดยาที่แนะนำ Asthma: อายุ ≥ 12 ปี: Evohaler: พ่น 2 กด วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น COPD: ผู้ใหญ่: Evohaler : พ่น 2 กด วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น |
| เภสัชวิทยา | Salmeterol, a long acting β_2 -agonist which acts locally in the lung to mediate bronchodilation. Fluticasone, a corticosteroid with mainly glucocorticoid activity, reduce symptoms and exacerbations of asthma |
| เภสัชจลนศาสตร์ | Onset: Bronchodilation: 10-20 minutes. Duration: Bronchodilation: 12 hr |
| ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ | ข้อห้ามใช้โดยทั่วไป (contraindication) คือ ผู้ที่แพ้ (hypersensitivity) โปรตีนจากนม และ acute episode of asthma or COPD ข้อควรระวังในการใช้ในผู้ป่วย adrenal suppression, bronchospasm, cardiovascular disorder เช่น coronary insufficiency , cardiac arrhythmias hypertension hypokalemia, localized infections of the mouth and pharynx due to Candida albicans , glaucoma , cataract , herpes simplex in eye , hepatic impairment, osteoporosis, thyroid problem, pneumonia and lower respiratory tract infections (โดยเฉพาะในผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี -ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี |
| อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา | อาการแสดงของ toxicity ได้แก่ headache, oral candidiasis, palpitation, tremor , |

| | |
|---|---|
| | paradoxical bronchospasm |
| มีข้อควรทราบและพึงระวังเกี่ยวกับการใช้ยาสูดประเภทสเตอรอยด์คือ | <ul style="list-style-type: none"> - ยาสูดนี้ใช้ในขนาดน้อย ผลข้างเคียงไม่มากเท่ากับยาเกิน - ยาสูดนี้ต้องสูดเป็นประจำทุกวัน ถึงแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพื่อลดอักเสบของหลอดลมอย่างต่อเนื่อง - ยาสูดนี้ไม่ได้ผลในการบรรเทาอาการขณะจับหืด (ต้องใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้นเพื่อบรรเทาการจับหืด) - กระบอกยามีสีน้ำตาล สีแดง หรือ สีส้ม - บางรายอาจมีอาการจับหืดเกิดขึ้นภายหลังการสูดยาทันที (paradoxical bronchospasm) ซึ่งเนื่องจากการแพ้สารอื่นในตัวยา ควรงดใช้ยาสูดชนิดนั้นๆ - บางรายอาจมีฝ้าเชื้อราเกิดขึ้นในปาก ซึ่งป้องกันได้โดยการบ้วนปากหลังสูดยาทุกครั้งเพื่อล้างคราบยาออก - เมื่อใช้ยานี้ในขนาดสูง (เกินกว่า 1,000 ไมโครกรัมของบิวตีไซโนลด์/หรือเทียบเท่า ต่อ วัน) และเป็นระยะเวลาานานอาจเกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ต้อกระจก, ต้อหิน, ภาวะกระดูกบาง (โดยเฉพาะสตรีหมดประจำเดือนแล้ว), การเติบโตของเด็กช้ากว่าปกติ, เสียงแหบ เป็นต้น - บางรายอาจมีภาวะโรคเบาหวานกำเริบ - บางรายอาจมีเกลือแร่ในเลือดผันผวน เช่น โปตัสเซียมต่ำ - บางรายอาจมีวัณโรคกำเริบ <p>โดยทั่วไปยาสูดประเภทสเตอรอยด์นี้ถือว่าปลอดภัย ไม่มีข้อห้ามใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้ เท่าที่จำเป็น ข้อพึงระวังก็คือโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้(เป็นรุนแรง) ในระหว่างตั้งครรภ์ จะเกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์มากกว่าผลข้างเคียงจากยา</p> |
| ค่าใช้จ่ายด้านยา | 700 บาท/กล่อง |