

ชื่อยาทั่วไป	Furosemide injection 10 mg/ml 2 ml
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาฉีด สารละลาย 2 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Furosemide 20 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	กลุ่มยา Diuretics
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ใช้เป็นยาขับปัสสาวะเพื่อรักษาอาการบวมและคั่งของน้ำซึ่งเป็นผลมาจากโรคหัวใจ โรคตับ หรือใช้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง <u>วิธีใช้/ขนาดยา</u> เด็ก IM/IV 0.5 - 1 มก./กก./dose Max. 6 มก./กก./วัน ผู้ใหญ่ IM/IV 20 - 40 มก./dose ทุก 6 - 12 ชั่วโมง
เภสัชวิทยา	*ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมกลับของโซเดียม คลอไรด์ ทำให้น้ำ โซเดียม คลอไรด์ ถูกขับออกมาในปัสสาวะเพิ่มขึ้น -ผลทางเภสัชวิทยา ยาเพิ่มเลือดมางไต และทำให้เลือดในส่วนของชั้น medulla ไหลไปยังส่วนของ cortex ซึ่งเป็นส่วนของไตที่มีหน้าที่ในการกรอง การดูดซึมกลับ และการขับออกของสารเป็นจำนวนมาก ยาทำให้หลอดเลือดดำขยายตัว ซึ่งจะทำให้แรงดันเลือดเข้าสู่หัวใจลดลง ปริมาณเลือดกลับสู่หัวใจน้อยลง หัวใจทำงานดีขึ้น
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในคนที่แพ้ยา หรือส่วนประกอบของยา
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ความดันเลือดต่ำรุนแรง หลอดเลือดหัวใจอักเสบทำให้ตาย หัวใจหยุด หัวใจเต้นช้า เวียนศีรษะรุนแรงคล้ายจะหมดสติ ปวดท้องรุนแรง ตับอักเสบ เลือดจาง ภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด เม็ดเลือดขาวต่ำ การเห็นภาพเป็นสีเหลือง ตาพร่า เป็นพิษต่อหู มีอาการที่อาจบ่งชี้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไต
ค่าใช้จ่ายค่านยา	6.25 บาท