

ชื่อยาทั่วไป	Furosemide
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาเม็ด Furosemide ขนาด 40 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	กลุ่มยา Diuretics
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> 1. รักษาภาวะบวมเนื่องจากโรคหัวใจล้มเหลว โรคตับ หรือโรคไต 2 ใช้ร่วมกับยาลดความดันอื่นๆ เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง <u>วิธีใช้และขนาดยา</u> - เริ่มต้นที่ 20 - 80 มิลลิกรัม /ครั้ง สามารถเพิ่มได้ครั้งละ 20 - 40 มิลลิกรัม /ครั้ง ทุก 6 - 8 ชั่วโมง - ขนาดยาสูงสุด 600 มิลลิกรัม/วัน - รักษาความดันโลหิตสูง (Hypertension) ตาม JNC7 : 20 - 80 มิลลิกรัม แบ่งให้ 2 ครั้ง/วัน
เภสัชวิทยา	-ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมกลับของ โซเดียม คลอไรด์ ทำให้น้ำ โซเดียม คลอไรด์ ถูกขับออกมาในปัสสาวะเพิ่มขึ้น -ผลทางเภสัชวิทยา ยาเพิ่มเลือดมายังไต และทำให้เลือดในส่วนของชั้น medulla ไหลไปยังส่วนของ cortex ซึ่งเป็นส่วนของไตที่มีหน้าที่ในการกรอง การดูดซึมกลับ และการขับออก ของสารเป็นจำนวนมาก ยาทำให้หลอดเลือดดำขยายตัว ซึ่งจะทำให้แรงดันเลือด เข้าสู่หัวใจลดลง ปริมาณเลือดกลับสู่หัวใจน้อยลง หัวใจทำงานดีขึ้น
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<u>ข้อห้ามใช้</u> 1. ผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา Furosemide หรือ แพ้ sulfonyleurea 2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะออกน้อยผิดปกติ (anuria) 3. ผู้ที่มีภาวะ hepatic coma หรือภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ผลข้างเคียง -พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบอาการ Acute hypotension, chronic aortis, orthostatic hypotension, blurred vision, dizziness, vasculitis, erythema multiforme, photosensitivity, hypocalcemia, hypokalemia -อาการอื่น ไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด ท้องเสีย ปากแห้ง มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ การได้ ยินลดลง หรือมีเสียงกริ่งในหู กระจายน้ำมากขึ้น หัวใจเต้นผิดปกติ ปวดหลัง ส่วนล่าง หรือสีข้างลำตัว อารมณ์แปรปรวน ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเป็นตะคริว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องมาก ผื่นคัน

	<p>ผิวหนังลอก ชาบริเวณมือหรือเท้า มีเลือดออก หรือมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย อ่อนเพลียผิดปกติ ตาหรือตัวเหลือง หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก น้ำหนักลด อย่างรวดเร็วผิดปกติ</p>
<p>ค่าใช้จ่ายด้านยา</p>	<p>1 บาท</p>
<p>คำแนะนำที่ควรให้ผู้ป่วย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีที่รับประทานยารักษา 1 ครั้ง ให้รับประทานยาตอนเช้าไม่ควรรับประทาน ยานี้ก่อน นอนเนื่องจากยาจะมีผลทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น 2. ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง 3. การรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือนมจะช่วยลดอาการไม่สบายท้องซึ่งเกิด จากยาได้ 4. ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน 5. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยไม่จำเป็นและควรใช้ครีมป้องกันแสงแดด เนื่องจากยานี้ ทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดมากขึ้น 6. ควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ เนื่องจากอาจเกิดอาการหน้ามืดได้ 7. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้