

ชื่อยาทั่วไป	Glyceryl guaiacolate
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Syrup 100 mg/5ml ยาน้ำ 1 ซ้อนชา (5 มิลลิลิตร ) ประกอบด้วย Glyceryl Guaiacolate (Guifenesin) 50 มิลลิกรัม Ammonium Chloride 75 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	ยาขับเสมหะ
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ยาขับและละลายเสมหะ <u>ขนาดที่ใช้</u> อายุ < 2 ปี 1 ชีชี-2.5 ชีชี วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร อายุ 2-5 ปี ½ - 1 ซ้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน
เภสัชวิทยา	guaifenesin ออกฤทธิ์กระตุ้นทำให้น้ำหลังจากทางเดินหายใจมากขึ้น ทำให้ เสมหะอ่อนตัวและถูกขับออกไปได้ มักใช้ผสมกับตัวยาอื่นในยาเตรียมแก้ไข้เพื่อ ช่วยขับเสมหะ
เภสัชจลนศาสตร์	guaifenesin ถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร และถูกขับออกทางปัสสาวะอย่าง รวดเร็วในรูปของ b - (2-methoxyphenoxy) lactic acid
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที <b>มีดังนี้</b> ผื่นคัน ลมพิษ บวมบริเวณใบหน้าริมฝีปากหรือลิ้น 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ <b>มีดังนี้</b> ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ง่วงซึมหรือวิงเวียนศีรษะ
ค่าใช้จ่ายด้านยา	11.50 บาท