

ชื่อยาทั่วไป	GLIBENCLAMIDE
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ในแต่ละเม็ด ประกอบด้วยตัวยา Glibenclamide หรือ Glipizide 5 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทานกลุ่ม sulfonylureas
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p>ผู้ใหญ่</p> <p>-ขนาดเริ่มต้น Glibenclamide รับประทานครั้งละ ½- 1 เม็ด (2.5-5 มิลลิกรัม) ก่อนอาหารเช้า ปรับขนาดยาได้ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัม ทุก 1 สัปดาห์ ตามความจำเป็น</p> <p>-ขนาดควบคุม Glibenclamide รับประทานครั้งละ ¼ - 4 เม็ด ขนาดรับประทานที่ไม่เกิน 2 เม็ด (10 มิลลิกรัม) ให้รับประทานวันละครั้งก่อนอาหารเช้า ถ้าขนาดเกิน 2 เม็ด ให้แบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น</p> <p>**ในผู้ป่วยที่อ่อนเพลียมาก ขาดอาหาร ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อน้ำตาลในเลือดต่ำ ให้เริ่มต้นในขนาด 1.25 มิลลิกรัมต่อวัน</p> <p>หมายเหตุ – ถ้าต้องการเปลี่ยนจากการใช้ยารักษาเบาหวานตัวอื่นมาเป็น Glibenclamide สามารถหยุดยาอื่นได้ทันที</p> <p>- ถ้าเปลี่ยนจากการใช้อินซูลินมาเป็น Glibenclamide ในผู้ป่วยที่ฉีดอินซูลินต่ำกว่า 40 ยูนิต ต่อวัน สามารถหยุดอินซูลินได้ทันที แต่ในรายที่ฉีดมากกว่า 40 ยูนิตต่อวัน ให้ลดขนาดอินซูลินลง 50% ในวันแรกพร้อมกับให้ Glibenclamide 5 มิลลิกรัม ครั้งเดียวแล้วค่อยๆ ปรับขนาดยารับประทานขึ้นตามความเหมาะสม</p>
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์เพิ่มการหลั่งของ insulin
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับผู้ป่วยเบาหวานชนิด insulin-dependent โรคเบาหวานที่เกิดภาวะ ketosis, acidosis, diabetic coma ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ ดิเคซีอย่างรุนแรงหรือเสียเลือดมาก ผู้ป่วยโรคตับ ไต หรืออวัยวะอื่นรุนแรง ผู้ป่วยหัวใจวาย ผู้ป่วยแพ้ยากกลุ่ม sulfonylurea/sulfonamide หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	<p>-คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเดิน ท้องผูก แสบท้อง</p> <p>- อาจมีผื่นแพ้ยาตามผิวหนัง คัน ผื่นแดง และเลือดออก</p> <p>- อาจมีอาการทางระบบเลือด</p>
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1 บาท