

ชื่อยาทั่วไป	HYDROCHLOROTHIAZIDE
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ในแต่ละเม็ด ประกอบด้วยตัวยาหลัก คือ HCTZ (Hydrochlorothiazide) 25 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	Antihypertensive
Pregnancy Category	B (manufacturer)/ D (expert analysis)
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ขนาดและวิธีการใช้</u> ผู้ใหญ่ : <u>ลดอาการบวม</u> : รับประทาน วันละ 25 – 200 มิลลิกรัม หลังอาหาร โดยแบ่งให้ วันละ 1-2 ครั้ง <u>โรคความดันโลหิตสูง</u> : รับประทานวันละ 12.5-50 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า ** ผู้สูงอายุ รับประทานวันละ 12.5-25 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้ในผู้ป่วย anuria และผู้ป่วยที่แพ้ยาในกลุ่ม thiazide หรืออนุพันธ์ของ sulfonamide - ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับ ตไต เบาหวาน เก๊าท์ และมารดาที่ให้นมบุตร - ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ควรตรวจวัดระดับอิเล็กโทรไลต์ น้ำตาล การทำงานขิงไต และไขมันในเลือดอย่างสม่ำเสมอ - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ หญิงตั้งครรภ์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	Orthostatic hypotension, hypotension, photosensitivity, hypokalemia, anorexia, epigastric distress
ค่าใช้จ่ายค่านยา	0.5 บาท