

ชื่อยาทั่วไป	Haloperidol
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Haridol , Haridol Decanoate , Halolop , Halo - P , Haperdol / GPO
รูปแบบ / ความแรง	-tablet ขนาด 2 , 5 mg -injection 10 mg/ml
กลุ่มยา	Antipsychotic agent
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	-ใช้ควบคุมอาการทางจิต และควบคุมอาการกระตุก ( Tics ) -ใช้แก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก -ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรงโดยให้ยาในระยะสั้น ๆ รับประทานวันละ 6 - 20 mg divided dose วันละ 2 - 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
เภสัชวิทยา	-ออกฤทธิ์โดยการ block Dopamine D2 receptor -มีฤทธิ์ Anticholinergic อ่อน ๆ
เภสัชจลนศาสตร์	-ยาถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร ความเข้มข้นสูงสุด ของยาใน plasma เกิด ภายใน 2 - 6 ชม. เมื่อฉีดยา IM ยาจะมีความเข้มข้นสูงสุดภายใน 10 - 20 นาที -ยาถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ ยาจับกับ plasma protien มากกว่า 90 % -ยาถูกขับถ่ายออกทางปัสสาวะ และอุจจาระอย่างช้า ๆ ในรูป metabolite และ free form - ยามี half life 13 - 35 ชม
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ผู้ป่วยโคม่า, ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า เนื่องจากแอลกอฮอล์หรือยาที่ทำให้เกิด อาการซึมเศร้า, โรคปาร์กินสัน, ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ฮาลโดล, การเปลี่ยนแปลง ของ basal ganglia
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น มึนงง หลงลืม กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย เลือดออกผิดปกติ
ค่าใช้จ่ายด้านยา	-tablet ขนาด 2 mg 1.5 บาท/เม็ด -tablet ขนาด 5 mg 1.5 บาท/เม็ด -injection 10 mg/ml 12.5 บาท/Ampule