

ชื่อยาทั่วไป	Hydroxyzine
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Tablet 10mg Syrup 2 mg/ml
กลุ่มยา	กลุ่ม antihistamine
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p>ไฮดรอกซิซีน (hydroxyzine) เป็นยาด้านฮิสตามีน (antihistamines) ใช้สำหรับบรรเทาอาการหรือป้องกันไข้ละอองฟาง (hay fever) และการแพ้ชนิดต่างๆ ออกฤทธิ์โดยป้องกันผลของสารที่เรียกว่าฮิสตามีน (histamine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายในร่างกาย ฮิสตามีน (histamine) ทำให้เกิดอาการคัน จาม น้ำมูกไหลหรือน้ำตาไหล รวมทั้งอาจทำให้หลอดลมหดตัวซึ่งส่งผลให้เกิดการหายใจลำบากในผู้ป่วยบางราย อาการข้างเคียงของยาด้านฮิสตามีน (antihistamines) ทำให้เกิดอาการง่วงซึมจึงมีการนำมาใช้ในการช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น</p> <p>1-2 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง</p> <p><i>Oral</i></p> <p>Short-term management of anxiety</p> <p>Adult: 50-100 mg 4 times daily.</p> <p>Renal impairment: Moderate-severe impairment: Reduce dose by 50%.</p> <p>Hepatic impairment: Reduce total daily dose by 33%.</p> <p><i>Oral</i></p> <p>Pruritus in acute and chronic urticaria and dermatosis</p> <p>Adult: Initially, 25 mg at night increased if required up to 25 mg 3-4 times daily.</p> <p>Child: 6 mth-6 yr: 5-15 mg daily, increased to 50 mg/day in divided doses; >6 yr: Initially, 15-25 mg/day, increased up to 50-100 mg/day.</p> <p>Renal impairment: Moderate-severe impairment: Reduce dose by 50%.</p> <p>Hepatic impairment: Reduce total daily dose by 33%.</p> <p><i>Oral</i></p> <p>Adjunct to pre- or post-operative sedation</p> <p>Adult: 50-100 mg.</p>

	<p>Child: 600 mcg/kg.</p> <p>Renal impairment: Moderate-severe impairment: Reduce dose by 50%.</p> <p>Hepatic impairment: Reduce total daily dose by 33%.</p> <p><i>Intramuscular</i></p> <p>Prompt control of anxiety or agitation</p> <p>Adult: Initially, 50-100 mg, may repeat every 4-6 hr if necessary.</p> <p>Renal impairment: Dose adjustment is required.</p> <p>Hepatic impairment: Dose adjustment is required</p>
เภสัชวิทยา	กลไกการออกฤทธิ์ทั้งสองตัวออกฤทธิ์โดยการไปแข่งชิงกับ histamine ในการจับกับ H ₁ -receptor ในทางเดินอาหารหลอดเลือดและทางเดินหายใจ
เภสัชจลนศาสตร์	<p>Absorption: Absorbed rapidly from the GI tract (oral).</p> <p>Metabolism: Converted to cetirizine (has antihistaminic properties).</p> <p>Excretion: 20 hr (elimination half-life).</p>
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะและควบคุมเครื่องจักร - หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ - ยานี้อาจทำให้ตาแห้งและการมองเห็นไม่ชัดเจนได้ หากท่านใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกไม่สบายตา ให้ปรึกษาจักษุแพทย์ - แจ้งแพทย์ว่าท่านกำลังรับประทานยานี้อยู่ หากท่านเข้ารับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการข้างเคียงคือ อาการง่วงซึม ปวดหัว อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เกิดผื่นและผื่นแพ้ยาที่อวัยวะเพศชายของเด็ก ปากแห้ง ความดันตก ใจสั่น
ค่าใช้จ่ายด้านยา	<p>1 บาท/เม็ด</p> <p>12 บาท/ขวด</p>