

ชื่อยาทั่วไป	Hyoscine
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาฉีด 20 มิลลิกรัม/ 1 มิลลิลิตร ยาเม็ด 10 มิลลิกรัม/เม็ด ยาน้ำ 5mg/ml
กลุ่มยา	antimuscarinic (anticholinergic)
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> บรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง, ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาแผลในทางเดิน อาหาร <u>ขนาดที่ใช้</u> 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง ทุก 4 ชั่วโมง ขนาดสูงสุด 5 มิลลิลิตร -รับประทาน 10-20 มิลลิกรัม (1-2 เม็ด) วันละ 3-5 ครั้ง ขนาดสูงสุด 6 เม็ด/วัน(3) -สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
เภสัชวิทยา	ยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาท acetylcholine (ACh) ที่ปลายประสาท parasympathetic site ในกล้ามเนื้อเรียบ ทำให้กล้ามเนื้อเรียบไม่หดตัว(
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	คำเตือน - ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ควรใช้ตามแพทย์สั่ง - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อหิน - หากเกิดอาการชีพจรเต้นเร็ว มึนงง หรือสายตาพร่า ให้หยุดใช้ยา ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ต่อมลูกหมากโต หรือผู้ป่วยที่มีทางเดินปัสสาวะอุดตัน , ลำไส้ไม่บีบตัว , หรือส่วนปลายกระเพาะปัสสาวะตีบซึ่งอาจอุดตันได้ - ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยสูงอายุ เด็กซึ่งมีไข้ และในผู้ป่วยซึ่งมีภาวะหัวใจ เต้นเร็ว
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการที่พบบ่อย คือ ปากคอแห้ง กระหายน้ำ กลืน ลำบาก อาเจียน งุนงง เดินไม่ตรง รูปร่างตาชยาย กลัวแสง การปรับสภาพ ของตาเสีย และความดันภายในลูกตาเพิ่มขึ้น - ลดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ - อาการแพ้ เกิดผื่นที่ผิวหนังบริเวณหน้า และส่วนบนของร่างกาย - เกิดอาการหัวใจเต้นช้าชั่วคราว แล้วตามด้วยอาการหัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น
ค่าใช้จ่ายด้านยา	ยาฉีด 20 มิลลิกรัม/ 1 มิลลิลิตร 5.75 บาท

	ยาเม็ด 10 มิลลิกรัม/เม็ด 1.15 บาท
	ยาน้ำ 5mg/ml 11.50 บาท