

ชื่อยาทั่วไป	INDOMETHACIN
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Capsule 25 mg
กลุ่มยา	Nsaids
Pregnancy Category	C (oral)/D (3rd trimester)
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้รักษาอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ปวดข้อรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์</li> <li>- อาจใช้เป็นยาลดไข้ในผู้ป่วยที่เป็น Hodgkin's disease เมื่ออาการไข้นั้นไม่ตอบสนองต่อยาลดไข้ชนิดอื่นที่มีพิษน้อยกว่า แต่ไม่ควรใช้เป็นยาแก้ปวดลดไข้ในกรณีทั่วไป</li> </ul> <p><u>ขนาดและวิธีการใช้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยานี้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ควรให้รับประทานพร้อมอาหารหรือนม หรือรับประทานหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตามมากๆ</li> <li>- ใช้แก้ปวดข้อ จากโรคปวดข้อรูมาตอยด์ ข้อเสื่อม ให้ครั้งละ 1 แคปซูล (25 มิลลิกรัม) วันละ 2-3 ครั้ง (สูงสุด 150-200 มิลลิกรัมต่อวัน)</li> <li>- ใช้รักษาโรคเก๊าท์ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล (50 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง แล้วค่อยลดขนาดยาลงเมื่ออาการดีขึ้น</li> </ul>
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<p><u>ข้อควรระวัง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคหืด โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน โรคเลือดไหลไม่หยุด และโรคเลือดชนิดอื่นๆ</li> <li>- ยานี้จะบดบังอาการติดเชื้อได้</li> <li>- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยสูงอายุ</li> <li>- ผู้ที่ใชยานี้ไม่ควรขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพราะอาจเกิดอันตรายได้</li> <li>- ควรตรวจเลือดและตรวจตาระหว่างที่ใชยานี้อยู่ และผู้ป่วยที่แพ้แอสไพริน อาจแพ้ยานี้ได้</li> </ul> <p><u>ข้อห้ามใช้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ บวม น้ำ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อาการผิดปกติของเม็ดเลือด ตับหรือไต</li> <li>- ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มนี้</li> <li>- ห้ามใช้ในเด็ก สตรีมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร</li> <li>- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เกิดอาการหอบหืด น้ำมูกไหล คัน หลังได้รับยานี้ และผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพริน หรือ NSAIDs ตัวอื่น</li> </ul>

<p>อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา</p>	<p>อาการที่พบบ่อยคือ มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พบอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกทางช่องคลอด</li> <li>- อาการอื่นๆ ได้แก่ ความผิดปกติทางเม็ดเลือด มีเลือดออกในปัสสาวะ บวม น้ำและน้ำหนักเพิ่ม ความดันโลหิตสูง</li> </ul>
<p>ค่าใช้จ่ายด้านยา</p>	<p>1 บาท</p>