

ชื่อยาทั่วไป	Ibuprofen
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาเม็ด 400 มก./เม็ด ยาเม็ด 200 มก./เม็ด ยาน้ำ 100 มก./5 ml
กลุ่มยา	Nsaids
Pregnancy Category	B (CATD กรณีใช้ในไตรมาสที่ 3)
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ลดไข้,ลดอาการอักเสบ <u>ขนาดที่ใช้</u> ยากิน -ลดไข้,แก้ปวด 10-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง ทุก 6-8 ชั่วโมง ขนาดสูงสุด 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน (ให้ยาขนาด 400 มก./เม็ด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที) - สำหรับเด็กที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า 30 กิโลกรัม ให้ใช้ขนาดยาวันละ 20 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง แต่ขนาดสูงสุดไม่ควร เกินวันละ 500 มิลลิกรัม - สำหรับผู้ใหญ่ หรือเด็กอายุ 30 กิโลกรัมขึ้นไป * ให้ใช้ขนาดยาวันละ 900-2,400 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง ขนาด สูงสุดไม่ควรให้เกินวันละ 2,400 กรัม * ขนาดยาเพื่อบรรเทาอาการปวด ให้รับประทานครั้งละ 200-400 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	-ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ , ยาแอสไพริน หรือ NSAIDs อื่นๆ -ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร -ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็น โรคกระเพาะอาหาร - ถ้าใส่ยักเสบ , โรคหอบ หืด , โรคหัวใจ , โรคเกี่ยวกับ bleeding disorder , ผู้ป่วยที่ได้รับยากันเลือดแข็งตัว อยู่ และผู้ป่วยที่ตับและไตทำงานผิดปกติ - ถ้าใช้ร่วมกับยาแอสไพริน หรือแอลกอฮอล์ จะมีผลเพิ่มการเกิดแผลใน กระเพาะอาหารได้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	- อาการที่พบบ่อย คือ มีแผลและเลือดออกในทางเดิน อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เยื่อบุช่องปากอักเสบ อุจจาระเป็นสีดำ - อาการอื่น เช่น ปวดศีรษะ กระวนกระวาย บวม น้ำ ผิวหนังเป็นผื่นแดงคัน หู อื้อ ตามัว นอนไม่หลับ อาจพบการทำงานของตับและไตผิดปกติ

	- อาการแพ้ป็นน้อย แต่อาจเกิด Agranulocytosis และ Thrombocytopenia ได้
ค่าใช้จ่ายด้านยา	ยาเม็ด 400 มก./เม็ด 1 บาท ยาเม็ด 200 มก./เม็ด 1 บาท ยาน้ำ 100 มก./5 ml 13 บาท