

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|-----------|------------|---|-----------|------------|---|-----------|------------|---|-----------|-------------|-----|-----------|----------------------|---|-----------|------------|------|-----------|--------------|----|-----------|----------------------------|-----|-----------|
| ชื่อยาทั่วไป | Multivitamin dry syrup 60ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ชื่อการค้า / ผู้ผลิต | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รูปแบบ / ความแรง | dry syrup 60ml <u>ส่วนประกอบ</u> ใน 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Vitamin A</td> <td>2,000</td> <td>ยูนิตสากล</td> </tr> <tr> <td>Vitamin D</td> <td>200</td> <td>ยูนิตสากล</td> </tr> <tr> <td>Vitamin C</td> <td>35</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B1</td> <td>1</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B2</td> <td>1</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B6</td> <td>1</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B12</td> <td>2.5</td> <td>ไมโครกรัม</td> </tr> <tr> <td>Calcium pantothenate</td> <td>5</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Folic acid</td> <td>0.05</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Nicotinamide</td> <td>10</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>d1- Toc-Tocopheryl acetate</td> <td>7.5</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> </table> | Vitamin A | 2,000 | ยูนิตสากล | Vitamin D | 200 | ยูนิตสากล | Vitamin C | 35 | มิลลิกรัม | Vitamin B1 | 1 | มิลลิกรัม | Vitamin B2 | 1 | มิลลิกรัม | Vitamin B6 | 1 | มิลลิกรัม | Vitamin B12 | 2.5 | ไมโครกรัม | Calcium pantothenate | 5 | มิลลิกรัม | Folic acid | 0.05 | มิลลิกรัม | Nicotinamide | 10 | มิลลิกรัม | d1- Toc-Tocopheryl acetate | 7.5 | มิลลิกรัม |
| Vitamin A | 2,000 | ยูนิตสากล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamin D | 200 | ยูนิตสากล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamin C | 35 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 1 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamin B2 | 1 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamin B6 | 1 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamin B12 | 2.5 | ไมโครกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcium pantothenate | 5 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folic acid | 0.05 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nicotinamide | 10 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d1- Toc-Tocopheryl acetate | 7.5 | มิลลิกรัม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลุ่มยา | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pregnancy Category | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ข้อบ่งใช้ <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ในภาวะขาดวิตามิน ในผู้ที่มีความต้องการวิตามิน ได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรัง , ขาดเจ็บรุนแรง , Hyperthyroidism และภาวะทุพโภชนาการ - ใช้เป็นวิตามินเสริมอาหารบำรุงร่างกาย ป้องกันการขาดวิตามินในหญิงมีครรภ์ หรือหญิงระยะให้นมบุตร ทารก และผู้ป่วยเด็กที่ต้องทำ Haemodialysis ขนาดและวิธีการใช้ <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเป็น Dry powder ให้เติมน้ำสะอาดลงในขวด (น้ำดื่มสุกที่เย็นแล้ว) เขย่า ให้เข้ากัน แล้วเติมน้ำให้ถึงขีดข้างขวดอีกครั้งจนถึงขีดปริมาตร - เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง หรือตาม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>คำแนะนำของแพทย์</p> <p>- เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 – 2 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์</p> |
| เภสัชวิทยา | - |
| เภสัชจลนศาสตร์ | - |
| ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ | -ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน |
| อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา | - |
| คำเตือน | -เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อผสมน้ำแล้วควรเก็บในตู้เย็น และใช้ภายใน 14 วัน |
| ค่าใช้จ่ายด้านยา | 16.5 บาท/ขวด |