

ชื่อยาทั่วไป	Multivitamin																		
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-																		
รูปแบบ / ความแรง	<p>ในแต่ละเม็ด ประกอบด้วย</p> <table border="0"> <tr> <td>Vitamin A</td> <td>2,500</td> <td>ยูนิตสากล</td> </tr> <tr> <td>Vitamin D</td> <td>300</td> <td>ยูนิตสากล</td> </tr> <tr> <td>Vitamin C</td> <td>15</td> <td>ยูนิตสากล</td> </tr> <tr> <td>Thiamine HCL</td> <td>1</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Riboflavin</td> <td>0.5</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> <tr> <td>Nicotinamide</td> <td>7.5</td> <td>มิลลิกรัม</td> </tr> </table>	Vitamin A	2,500	ยูนิตสากล	Vitamin D	300	ยูนิตสากล	Vitamin C	15	ยูนิตสากล	Thiamine HCL	1	มิลลิกรัม	Riboflavin	0.5	มิลลิกรัม	Nicotinamide	7.5	มิลลิกรัม
Vitamin A	2,500	ยูนิตสากล																	
Vitamin D	300	ยูนิตสากล																	
Vitamin C	15	ยูนิตสากล																	
Thiamine HCL	1	มิลลิกรัม																	
Riboflavin	0.5	มิลลิกรัม																	
Nicotinamide	7.5	มิลลิกรัม																	
กลุ่มยา	-																		
Pregnancy Category	A																		
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>Multivitamin ถือเป็นยาที่ใช้เมื่อมีการได้รับ vitamin หรือแร่ธาตุที่ไม่มี ความเพียงพอ จากการรับประทานอาหาร โดย multivitamin ใช้ในการรักษา ภาวะการขาดเนื่องจากการป่วย ตั้งครรภ์ โภชนาการไม่ดี รวมถึงปัญหาทางระบบ การย่อยด้วย และอีกทั้งอาจมีการใช้ด้วยเหตุผลอื่น</p> <p><u>ขนาดและวิธีการใช้</u></p> <p>รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง</p> <p>***ยานี้อาจจะสะสมในร่างกายทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่ กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน***</p>																		
เภสัชวิทยา	-																		
เภสัชจลนศาสตร์	-																		
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ระวังการได้รับวิตามินเอ และวิตามินดี ในขนาดสูงจนอาจเกิดพิษได้																		
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องร่วง																		
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1 บาท																		