

ชื่อยาทั่วไป	Sodium fluoride oral solution
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	oral solution 0.05% 250 ml
กลุ่มยา	Minerals
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p>การใช้ยาอมบ้วนปากผสมฟลูออไรด์พบว่าสามารถป้องกันฟันผุได้ร้อยละ 28 ยาอมบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ที่ใช้ได้แก่ 0.05% Sodium fluoride (NaF) แนะนำให้ใช้วันละครั้ง</p> <p>ข้อบ่งชี้</p> <p>ผู้ที่อายุ > 6 ปี และมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุปานกลางถึงสูง</p> <p>วิธีใช้</p> <p>-อมและกลืนทั่วปาก ใช้ปริมาณ 5-10 มิลลิลิตร อย่างน้อย 1 นาที</p> <p>-ไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่างน้อย 30 นาที</p>
เภสัชวิทยา	ยาอมบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่จะทำให้ฟลูออไรด์ใน plaque สูงมากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเก็บฟลูออไรด์ โดยฟลูออไรด์เหล่านี้ จะถูกปล่อยออกมาสู่สารละลายในช่องปาก เมื่อช่องปากอยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการเกิดโรคฟันผุ
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ไม่ควรใช้ในเวลาเดียวกับการแปรงฟันเพิ่มความถี่ในการสัมผัสกับฟลูออไรด์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	-
ค่าใช้จ่ายด้านยา	61 บาท/ขวด