

ชื่อยาทั่วไป	Suxamethonium chloride injection 0.5g/vial
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	injection 0.5g/vial 500 mg
กลุ่มยา	General Anaesthesia(Neuromuscular blocking drug)
Pregnancy Category	Pregnancy Category C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<b>ข้อบ่งใช้</b> ให้ร่วมกับยาสลบเพื่อให้สอด endothelial tube ได้ง่าย <b>ขนาด / วิธีการบริหารยา</b> - ฉีด IM ขนาด 2.5-4 mg/kgขนาดยารวมต้องไม่เกิน150 mg - ฉีด IV ขนาด 1 - 1.5 mg / kgขนาดยารวมต้องไม่เกิน 150 mg - maintenance dose 0.04 - 0.07 mg ทุก5 -10 นาทีถ้าจำเป็น
เภสัชวิทยา	Depolarizing skeletal muscle relaxant; no effect on consciousness, pain
เภสัชจลนศาสตร์	Onset: IV: 30-60 sec; IM: 2-3 min Duration: IV: 2-6 min; IM: 10-30 min Distribution: Small amounts of suxamethonium cross the placenta Metabolism: Rapidly hydrolysed by plasma cholinesterase. Excretion: 10% excreted unchanged in urine
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	-
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	- Increase or decrease blood pressure - Arrhythmia - Increase intracerebral pressure - Hypokalemia - กระตุ้นให้เกิด malignant hyperthermia - Apnea , hypoxia
Monitor	- Blood pressure< 90 /60mmHg - Heart rate < 60 - body temperature - ระดับ K , Ca ในเลือด
รายงานแพทย์เมื่อ(critical point)	- O2 saturation < 92 % - BP < 90 / 60 mmHgหรือ > 170 /100 mmhg - Heart rate < 60 ครั้ง/นาทีหรือ > 120 ครั้ง /นาที - EKG มีลักษณะผิดปกติ - body temperature > 40 องศาและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

	<ul style="list-style-type: none"><li>- ระดับ potassium ในเลือด &gt; 5 mmol / L</li><li>- วัด BP ทุก 5 นาที</li><li>- Monitor EKG และ O2 saturation continuous</li><li>- case ที่ผู้ป่วยตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ</li></ul>
ค่าใช้จ่ายด้านยา	103 บาท/amp