

ชื่อยาทั่วไป	Tetracaine eye drop
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	TETRACAINE / ALCON LABORATORIES (THAILAND) LTD.
รูปแบบ / ความแรง	Tetracaine eye drop 0.5% 10 ml
กลุ่มยา	OPHTHALMIC SOLUTION
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ข้อบ่งใช้ สำหรับ remove FB. หรือในกรณี surgery (long acting) หยอดครั้งละ 1 หยด q 5 min. 2-4 ครั้ง
เภสัชวิทยา	Tetracaine acts by preventing the generation and transmission of impulses along nerve fibres and at nerve endings; depolarisation and ion-exchange are inhibited. In general, loss of pain occurs before loss of sensory, autonomic and motor functions.
เภสัชจลนศาสตร์	เป็นยาชาชนิด ester type ที่ออกฤทธิ์นาน (ต่างจาก Licocaine หรือ Articaine ที่เป็น ยาชาชนิด amide-type) ซึ่งโดยทั่วไปยาชาตาชนิด ester จะมีความคงตัวน้อยกว่า ชนิด amide-type ยาชาตา Tetracaine HCl มีลักษณะใส ไม่มีสี
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อควรระวัง ใช้เฉพาะตาเท่านั้น ห้ามใช้ผิด ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้กับผู้ที่มีส่วนประกอบใดๆในยานี้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	มีอาการระคายเคืองเฉพาะที่เล็กน้อย การแพ้ที่เห็นได้ภายหลังการใช้ยาคือโรค ผิวหนังชนิดหนังลอก
คำแนะนำเพิ่มเติม	-ยานี้ต้องเก็บให้พ้นแสง ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40°C แต่อุณหภูมิที่ เหมาะสมสำหรับเก็บยานี้คือ 15-30°C (บริษัทผู้ผลิตแนะนำที่ 8-30°C) ; และห้ามแช่ แข็ง ยาชาตา tetracaine HCl สามารถเกิดปฏิกิริยา Hydrolysis ได้อย่างช้า ๆ และทำ ให้เกิดการตกตะกอนในลักษณะผลึกที่ชื่อ p-butylaminobenzoic acid crystals ดังนั้น ทุกครั้งที่จะมีการใช้ยานี้ ควรสังเกตลักษณะยา หากมีลักษณะขุ่น สีเปลี่ยนไป จากเดิม หรือมีผลึกเกิดขึ้น ให้ทิ้งยานี้ไปทันที -ห้ามไม่ให้ปลายหลอดยาไปสัมผัสตาผู้ป่วยเด็ดขาด มิเช่นนั้น จะทำให้เกิดการ contaminated ได้ และให้ทิ้งยาหลังเปิดใช้ครั้งแรกไปแล้ว 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายด้านยา	บาท/ขวด