

ชื่อยาทั่วไป	Thioridazine
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Ridazine , Thiomed / โมเดอร์แมนู
รูปแบบ / ความแรง	- tablet 100 mg
กลุ่มยา	Antipsychotic agent
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p>- ใช้ควบคุมอาการ โรคจิตเภทและโรคจิตอื่น ๆ</p> <p>- ใช้รักษากลุ่มอาการทางประสาท วุ่นวายใจ วิตกกังวล เครียด นอนไม่หลับ และ ความหวาดกลัวที่เกิดกับผู้สูงอายุ</p> <p>- ใช้รักษาพฤติกรรมที่ก้าวร้าวในเด็ก</p> <p>- รักษาอาการ schizophrenia , mania และอาการ psychosis อื่น ๆ</p> <p>รับประทานวันละ 150 - 300 mg หรืออาจสูงถึงวันละ 800 mg</p> <p>Short-term management of agitated or violent behaviour</p> <p>รับประทานวันละ 75 - 200 mg</p> <p>- รักษา anxiety , agitation and restlessness (non - psychotic emotional disturbances) ที่ไม่ได้ผลต่อการรักษาด้วยยา Benzodiazepines</p> <p>รับประทานวันละ 20 -200 mg</p> <p>- รักษาเด็กที่มี severe behavioural disorder (อายุ 1 - 5 ปี)</p> <p>รับประทานวันละ 1 mg/ kg body weight</p> <p>การให้ยาในผู้สูงอายุต้องลดขนาดยาลง</p>
เภสัชวิทยา	<p>- มีฤทธิ์ยับยั้ง Dopamine D2 receptor น้อย ทำให้เกิดผลการรักษาโรคจิตต่ำ</p> <p>- มีฤทธิ์ block Adrenoceptor ทำให้เกิด Postural hypotension</p> <p>- มีฤทธิ์ Anticholinergic เป็นสาเหตุให้เกิดอาการข้างเคียง คือ ตาพร่า ความดัน ในลูกตาเพิ่ม ปากคอแห้ง ท้องผูก และปัสสาวะกั่ง</p> <p>- มีฤทธิ์ยับยั้ง 5 HT receptor ทำให้มีฤทธิ์กดภาวะประสาทหลอนของผู้ป่วยโรคจิต</p> <p>- มีฤทธิ์ยับยั้ง Histamine H1 receptor เป็นผลให้ผู้ป่วยง่วง นอนหลับได้ หิวและ รับประทานมากขึ้น ทำให้อ้วน</p> <p>- มีฤทธิ์ยับยั้ง prolactin - release inhibitory factor จึงทำให้มีการหลั่ง prolactin เพิ่มขึ้น</p>
เภสัชจลนศาสตร์	<p>- ถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร ยาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกที่ตับ (first pass effect)</p> <p>- half life ของยา 26 - 36 ชม.</p> <p>- ยาจับกับ plasma protein 96 - 99 %</p> <p>- ยาถูก metabolite เป็น Mesoridazine และ Sulforidazine</p>
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	Thioridazine เป็น contraindication ในการใช้ร่วมกับ Propranolol หรือต้อง

	Monitor EKG ถ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกันเพราะเพิ่ม risk of life-threatening cardiac arrhythmias ของ Propranolol
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ง่วงนอน ความดันต่ำ ท้องผูก ปากแห้ง ตาพร่า ตัวเกร็ง เคลื่อนไหวช้า มือสั่น กระวนกระวาย
ค่าใช้จ่ายด้านยา	3 บาท/เม็ด