

ชื่อยาทั่วไป	Trazodone
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Trazodel
รูปแบบ / ความแรง	Tablet 50 mg
กลุ่มยา	Antidepressants , Serotonin Antiagonistand reuptake inhibitors (SARIs)
Pregnancy Category	Pregnancy Category C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p>ข้อบ่งใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> •รักษาโรคซึมเศร้า •รักษาโรคจิตเภท โรควิตกกังวล หรือใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเหล้า •อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร <p>Usual Adult Dosage</p> <p>ขนำยยาที่แนะนำ</p> <p>An initial dose of 150 mg/day in divided doses is suggested. The dose may be increased by 50 mg/day every 3 to 4 days. The maximum dose for outpatients usually should not exceed 400 mg/day in divided doses. Inpatients (i.e., more severely depressed patients) may be given up to but not in excess of 600 mg/day in divided doses.</p> <p><u>Maintenance</u></p> <p>Dosage during prolonged maintenance therapy should be kept at the lowest effective level. Once an adequate response has been achieved, dosage may be gradually reduced, with subsequent adjustment depending on therapeutic response.</p> <p>Although there has been no systematic evaluation of the efficacy of trazodone hydrochloride beyond 6 weeks, it is generally recommended that a course</p>
เภสัชวิทยา	Trazodone is a triazolopyridine antidepressant which selectively inhibits serotonin re-uptake at presynaptic neurons. Unlike TCAs, peripheral re-uptake of noradrenaline is not affected. It does not have very significant antimuscarinic properties but has a marked sedative action
เภสัชจลนศาสตร์	Absorption: Readily absorbed from the GI tract (oral); peak plasma concentrations after 1 hr (empty stomach), 2 hr (with food).

	<p>Distribution: Enters breast milk (small amounts). Protein-binding: 89-95%.</p> <p>Metabolism: Extensively hepatic by N-oxidation and hydroxylation. Metabolised to its active metabolite m-chlorophenylpiperazine via cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4.</p> <p>Excretion: Urine (as metabolites), faeces; 5-9 hr (terminal elimination half-life).</p>
<p>ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้</p>	<p>ข้อห้ามใช้</p> <p>-ไวต่อยา, กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด (ระยะแรก ๆ), Ventricular ผิดจังหวะ, arrhythmia, ล่างเดินเร็ว, ตับหรือไตล้มเหลว, การตั้งครรภ์, ช่วง, อายุการ 6 ปี.</p> <p>ความดันโลหิตสูงตัว (คุณอาจต้องปรับปริมาณยาลดความดัน), ประวัติภาวะองคชาติแข็งค้าง, อายุการ 18 ปี.</p> <p>-ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร</p>
<p>อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา</p>	<p>ระบบประสาทและอวัยวะรับรู้: ความอ่อนเพลีย, จุดอ่อนของการ, อาการปวดหัว, มึน, นอนไม่หลับ, อาการง่วงนอน, ในการกระตุ้น, หมอ, hypomania, เห็นภาพหลอน, สั่น, กล้ามเนื้อ twitching, apnoea เส้นใหญ่ (อัปเกรนด), aphasia, ataxia, akathisia, dyskinesia, paresthesia, ตีบสน, รั้ว sincopale, วิสัยทัศน์ไม่คมชัด, diplopia.</p> <p>ระบบไหลเวียนโลหิตและโลหิต (เลือด, hemostasis): ตัว hypotension, รวมทั้ง. ortostatical; หัวใจเต้นผิดจังหวะ, รวม (รวมทั้ง. Taha- และ bradycardia, หัวใจห้องล่างแบบ ectopic), congestive หัวใจล้มเหลว, leucocytosis หรือ lakopenia, neutropenia (โดยปกติขนาดเล็ก), โรคโลหิตจางเม็ดเลือดแดงแตก, methemoglobinemia.</p> <p>สำหรับส่วนของลำไส้: ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น, แห้ง และไม่รสชาติในปาก, gipersalivacia, ฟันผุ, โรคของเนื้อเยื่อโรคเหงือก, candidiasis ของช่องปาก, กลิ่นไส้, อาเจียน, ท้องอืด, โรคท้องร่วง, ท้องผูก, Cholestasis, ระดับการเพิ่มขึ้นของ bilirubin และ amylase ในเลือด, jaundice.</p> <p>ระบบ urogenital: รักษาปัสสาวะ, ปัสสาวะบ่อย, hematuria, ประจำเดือนก่อนวัยอันควร, Hirsutism, ความไคร่ที่เพิ่มขึ้น, ภาวะองคชาติแข็งค้าง, ภาวะ, retrograde พุงออกมา.</p> <p>แพ้: ผื่นผิวหนัง, urticaria.</p> <p>อื่น ๆ: Myalgia, อาการปวดในหน้าอก, ร่วง, โรคสะเก็ดเงิน, บวม</p>
<p>ค่าใช้จ่ายด้านยา</p>	<p>บาท/เม็ด</p>

