

ชื่อยาทั่วไป	Triamcinolone oral paste
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Triamcinolone acetonide 0.1 % ผสมในจีลิ่งชนิดป้ายปาก
กลุ่มยา	Toppical steroid
Pregnancy Category	C ไตรมาสแรกไม่ควรใช้
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ใช้ป้ายเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ อาการปวดของแผลภายในปากที่เกิดขึ้นบนเยื่อ ภายในปาก หรือบนลิ้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ถูกความร้อน ถูกสารเคมี ฟัน ขบ <u>วิธีใช้/ขนาดยา</u> บีบยาลงบนปลายนิ้วยาวประมาณ ¼ นิ้ว และใช้ป้ายลงบริเวณที่เป็นแผล โดยปาด ให้เป็นฟิล์มบางๆ ให้ทั่วแผล ยานี้ควรป้ายก่อนเข้านอนกลางคืน เพื่อให้ยาสัมผัส และรักษาแผลได้นานตลอดคืน บางรายอาจจำเป็นต้องป้ายวันละ 2 – 3 ครั้ง ควรป้ายหลังอาหารเป็นเวลาที่เหมาะสม ที่สุด
เภสัชวิทยา	ฤทธิ์ในการบรรเทาอาการอักเสบคือยับยั้งการเกิด Phagocytosis การเคลื่อนย้ายของ เม็ดเลือดขาว และการขยายตัวของหลอดเลือดฝอย ทำให้เยื่อหุ้ม Lysosome คงทน และลดการสังเคราะห์ Prostaglandin–thromboxane
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับแผลภายในปาก ที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น Herpes labialis / Herpangina
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	-
ค่าใช้จ่ายด้านยา	2.75 บาท