

ชื่อยาทั่วไป	Trihexyphenidyl Hydrochloride
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	ArtaneBenzhexol, ACA, Acamed, Tridyl, Pozhexol / GPO
รูปแบบ / ความแรง	tablet ขนาด 2 mg, 5 mg
กลุ่มยา	Antiparkinson's agent
Pregnancy Category	C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาโรค Parkinson (Postencephalitic, arteriosclerotic และ idiopathic)</li> <li>adjuvant therapy กับ levodopa</li> <li>ใช้ควบคุมอาการ extrapyramidal disorder จากยา Neuroleptic drugs ในโรค Parkinsonism</li> <li>เริ่มให้รับประทานยาในวันแรก 1-2 mg และเพิ่มครั้งละ 2 mg เป็นเวลานาน 3-5 วัน จนได้ขนาดยา 6-10 mg ต่อวัน</li> <li>ในผู้ป่วย Postencephalitic อาจรับประทานยาได้วันละ 12-15 mg โดยแบ่งให้ยาวันละ 3 ครั้งพร้อมอาหาร ถ้าให้รับประทานยาในขนาดสูงควรแบ่ง การให้ยาวันละ 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน</li> <li>ขนาดการรับประทานของยาแต่ละตัวจะลดลง และยา Trihexyphenidyl จะลด total bioavailability ของยา levodopa จึงควรให้ยาด้วยความระมัดระวัง การให้รับประทานยาขึ้นอยู่กับผลข้างเคียงและความรุนแรงของอาการ ให้ยาในขนาดวันละ 3-6 mg โดยการแบ่งให้</li> </ul> <p>Concomitant use with other anticholinergic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อาจใช้แทนยา anticholinergic บางส่วนหรือทั้งหมดได้ ถ้าให้ยาร่วมกัน ต้องลดการให้ยา anticholinergic ตัวอื่นลง</li> </ul> <p>Drug induced extrapyramidal disorders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เริ่มให้ยาขนาด 1 mg ก่อนและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาให้อยู่ในช่วง 5-15 mg จนสามารถควบคุมอาการได้</li> </ul> <p>Sustained release dose</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จะไม่ให้ยาในรูปแบบนี้ในการเริ่มต้นของการรักษา</li> <li>ขนาดยาที่ให้วันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า หรือแบ่งให้วันละ 2 ครั้งหรือให้ยาทุก 12 ชม.</li> </ul>
เภสัชวิทยา	<p>เหมือน Benztropine mesylate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็น competitive antagonist ของ acetylcholine ที่ cholinergic receptor</li> <li>ในผู้ป่วยโรค Parkinson ยาจะลด cholinergic activity ที่มากเกินไป บริเวณ basal ganglia</li> <li>มีฤทธิ์ antihistamine</li> </ul>
เภสัชจลนศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยาถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร แต่ยังไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงของยาที่</li> </ul>

	<p>แน่ชัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ยาเริ่มออกฤทธิ์ภายหลังจากรับประทานยาแล้ว 1 ชม. และช่วงเวลากการออกฤทธิ์นาน 6-12 ชม.</li> <li>• ยาถูกขับออกทางปัสสาวะ</li> </ul>
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<p>-หญิงตั้งครรภ์</p> <p>-เด็ก</p> <p>-ผู้สูงอายุ</p> <p>-ผู้ป่วยโรคลมชัก</p>
อาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รุม่านตาขยาย สายตาพร่ามัว ความดันภายในลูกตาเพิ่ม</li> <li>• คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ท้องผูก</li> <li>• เกิดอาการทางประสาท ชาตามปลายแขน ขา เมื่อยขา เกิดภาพหลอน ง่วงซึม ตื่นเต้น</li> <li>• ผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดสูงหรือ ivotoy จะเกิดอาการตื่นเต้น สับสน อ่อนเพลีย และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก ควรหยุดยา และถ้าต้องให้ยาคิดอีกต้องให้ยาในขนาดต่ำกว่าก่อน</li> </ul>
ค่าใช้จ่ายด้านยา	<p>-tablet ขนาด 2 mg 1 บาท/เม็ด</p> <p>-tablet ขนาด 5 mg 1 บาท/เม็ด</p>