

ชื่อยาทั่วไป	Verapamil
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Tablet 40 mg
กลุ่มยา	Calcium channel blocking agents
Pregnancy Category	Pregnancy Category C
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ข้อบ่งใช้ - ควบคุมการเกิดอาการปวดเค้นหัวใจ - รักษาภาวะหัวใจเสียจังหวะ (arrhythmias) และโรคความดันโลหิตสูง - ในบางครั้ง อาจใช้รักษาการปวดศีรษะไมเกรนและโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขนาดการใช้ยา (usual dosage) 40-80 mg รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง หรือ ตามแพทย์สั่ง
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้น L type voltage-gated calcium channels ซึ่งเป็น calcium channels ชนิดที่มีอยู่มากที่หัวใจและกล้ามเนื้อเรียบ มีผลลด transmembrane calcium influx ทำให้ความเข้มข้นของ Ca ²⁺ ในเซลล์ลดลงและมีฤทธิ์กด SA node, AV node ด้วย
เภสัชจลนศาสตร์	Onset of action: < 1.5 นาที (IV) , 30 นาที (รับประทาน) Protein binding: plasma 90% Bioavailability: oral 20-35% Half-life elimination: 6 hours excretion: ไต (70%) ทางเดินอาหาร (25%)
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ - ผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ - หญิงตั้งครรภ์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการไม่รุนแรง ท้องผูก ปวดศีรษะ เหนื่อย อ่อนเพลียมากกว่าปกติ หน้าแดง ร้อนวูบวาบ กลืนได้ อาเจียน ปวดท้อง ไม่สบายท้อง หรือ อาการเสียดยอดอก (heartburn) สมรรถภาพ ทางเพศลดลง ผื่นร้าย อาการรุนแรง มีไข้ เวียนศีรษะ หัวใจเต้นช้า (น้อยกว่า 50 ครั้งต่อนาที) หน้า ตา ริมฝีปาก ลิ้น แขน ขา หรือข้อเท้าบวม ตัวหรือตาเหลือง หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก หัวใจเต้น แรงหรือเต้นไม่เป็นจังหวะ เจ็บหน้าอก เจ็บหน้าอกบ่อยขึ้น และมีความรุนแรงมาก ขึ้น รู้สึกเหมือนจะเป็นลม ผื่นคัน
ค่าใช้จ่ายด้านยา	บาท/เม็ด