

ชื่อยาทั่วไป	cetirizine HCl
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Zyrtec®
รูปแบบ / ความแรง	รูปน้ำเชื่อมขนาด 1 mg/ml
กลุ่มยา	ยากลุ่ม Antihistamine รุ่นที่สอง
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ขนาดยาสำหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบสำหรับรักษาภาวะ Perennial allergic rhinitis, Seasonal allergic rhinitis และ Urticaria, chronic คือ 2.5-5 mg (0.5-1 ช้อนชา) วันละครั้ง หรือ 2.5 mg (0.5 ช้อนชา) วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น โดยขนาดยาสูงสุดคือ 5 mg/d (1 ช้อนชา)
เภสัชวิทยา	กลไกการออกฤทธิ์ทั้งสองตัวออกฤทธิ์โดยการไปแย่งชิงกับ histamine ในการจับกับ H ₁ – receptor ในทางเดินอาหารหลอดเลือดและทางเดินหายใจ
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต สตรีที่ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร ไม่มีข้อมูลการบ่งใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา หรือส่วนประกอบใดๆ ในตัวยานี้
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการง่วงซึม (2-4%) ปวดหัว (11%) นอนไม่หลับ(9%) เจ็บคอ (3-6%) ปวดท้อง (4-6%) คลื่นไส้อาเจียน (2-3%) ซึ่งอาการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ
ค่าใช้จ่ายด้านยา	12 บาท