

ชื่อยาทั่วไป	ROXITHROMYCIN
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Tablets 150 mg
กลุ่มยา	MACROLIDE GROUP
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคทอลซิลอักเสบ โรคไซนัสอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบ การติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นต้น</p> <p><u>วิธีใช้และขนาด</u></p> <p>ยานี้ใช้สำหรับรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ขนาดยาโดยทั่วไปรับประทานวันละ 300 มิลลิกรัม อาจแบ่งรับประทานวันละ 1 - 2 ครั้ง สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม ขนาดยาโดยทั่วไปรับประทาน 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง</p>
เภสัชวิทยา	Roxithromycin inhibits protein synthesis by irreversibly binding to the 50s ribosomal subunits thus blocking the transpeptidation or translocation reactions of susceptible organisms resulting in stunted cell growth.
เภสัชจลนศาสตร์	Roxithromycin มีข้อดีกว่า erythromycin ในด้านเภสัชจลนศาสตร์คือดูดซึมได้ดี สมบูรณ์จากทางเดินอาหารและสามารถแทรกเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆและ macrophage ได้ดีกว่า รวมทั้งมีค่า half life ที่ยาวกว่า สามารถให้เพียงวันละ 2 ครั้งได้นอกจากนี้ ยายังไม่มีผลต่อระบบเอนไซม์ CYP 450 ด้วย
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	<p>-ผู้ที่แพ้ต่อยาในกลุ่มแมโครไลด์</p> <p>-ใช้ร่วมกับ ergot alkaloids ที่มีฤทธิ์บีบเส้นเลือด</p>
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	<p>1. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ หน้าบวม ปากบวม หรือลิ้นบวม ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการกลืนลำบาก หรือหายใจลำบาก ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดเกร็งท้อง</p> <p>2.อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือรบกวนชีวิตประจำวันให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ</p> <p>3.ฝ้าขาวที่ปากหรือลิ้น คันหรือมีสารคัดหลั่งผิดปกติในช่องคลอด คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง</p>
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1.50 บาท